

CASO CLINICO N° 1

Varón de 66años con antecedentes personales de HTA desde hace 4 años ,

en tratamiento con **Captopril** 76 mg /dia.

Acude a la consulta para un estudio preoperatorio. Desde el punto de vista cardiopulmonar se encuentra asintomático. La tensión arterial era de 210/120 mmHg; en sus controles previos las cifras tensionales oscilaban entre 150–170 / 80–100 mmHg.(P.1). Se procedió a realizar un ajuste terapéutico y se citó al enfermo una semana más tarde. En el nuevo control la tensión arterial era de 200 /120 mmHg, y el paciente refería cefaleas. En esta visita nos comentó que llevaba 10 días en tratamiento con unos supositorios de **Indometacina** a razón de una dosis de 150 mg /día, por una lumbalgia que ya había presentado con anterioridad. Tras un nuevo reajuste de la medicación los valores de la tensión arterial descendieron rápidamente.

PREGUNTAS:

- 1.– Actitud terapéutica ante las circunstancias de este enfermo.
- 2.– Especifique los principales grupos farmacológicos utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial, indicando los posibles efectos indeseables que pueden producir.
- 3.– Indique los métodos de farmacovigilancia que conoce, características diferenciales entre ellos, y los criterios a seguir para imputar una reacción adversa a un fármaco.
- 4.– Indique los principios básicos de prescripción en el niño.
- 5.– Indique tres grupos terapéuticos que han de manejarse con cuidado en el anciano y especifique por que.