

CASO CLINICO N° 3

Mujer de 58 años con antecedentes de diabetes desde hace 8 años. Tratada inicialmente con dieta a la que añadió al poco tiempo **Glibenclamida**. En el momento actual toma 1 cp. de 5mg de **Euglucon** con desayuno, almuerzo y cena, mas **Acarbosa (GlucobayR)** 100 mg dos veces al día.

Ha mantenido glucemias en ayunas entre 160–200 mg/dl, pero en las últimas semanas se hallan alrededor de 300 mg/dl.

Presenta un síndrome poliúrico, polidíptico con poliuria nocturna importante y astenia. En las últimas semanas esta perdiendo peso, aproximadamente 5Kg. No hace dieta de forma estricta, pero ha eliminado de la misma los alimentos azucarados. Realiza escaso ejercicio físico.

Por un lado refiere desde hace 1 mes epigastralgia que cede tras la ingesta de alimentos.

Aporta analítica con los siguientes resultados: **glucemia basal 278, urea 54**

Creatinina 1.2, colesterol total 265, trigliceridos 330, HDL-C 30,

Ac. úrico 7.9, GOT 54, GPT 62, FA 345, GGT 102. Hemograma:

Hemoglobina 10.2.

En la exploración física destacan como datos de interés: peso de 70 Kg.

Talla 153 cm. T.A 170/100; fondo de ojo normal. Rodillas artrósicas.

Ausencia de reflejos patelar y aquileo. Insuficiencia venosa periféricas con pulsos pedios presentes.

La paciente nos comenta que en un programa de divulgación médica ha

oido hablar de un nuevo antidiabético : **Troglitazone**, asociado a resultados espectaculares en el tratamiento de la diabetes, y nos insiste en la posibilidad de prescribirle dicho farmaco.

PREGUNTAS:

- 1.– ¿cuáles son los objetivos terapéuticos que deben plantearse en la diabetes de esta paciente?
- 2.– Señale cuales son las posibilidades y variantes del tratamiento oral que puede adoptarse en la DM–II. Del tratamiento que sigue actualmente, ¿cuáles son los efectos secundarios mas importantes?
- 3.– Si inicialmente o en la evolución se decidiese por una terapia insulínica
¿qué pautas de insulino terapia podrían adoptarse en DM–II?. ¿Cómo habría que modificar la dosis en función de los controles glucémicos?
- 4.– ¿Qué patología le sugiere esta sintomatología?. Indique procedimiento diagnóstico y esquema terapéutico?
- 5.– Indique que aspectos considera más importante conocer y evaluar antes de la utilización de un farmaco

novedoso.