

El lasix al interraccionar con Dilantin el efecto es:

- a. Aumento el efecto del lasix
- b. Aumento en la diuresis
- c. Aumento de los efectos del inderal
- d. Disminuye los efectos del inderal
- e. B y C

Cual de los siguientes es cierto con respect a la potencia de una droga?

- a. Doble de la dosis
- b. Reciproco de la dosis
- c. El poder o fuerza inherente de una droga
- d. A y B
- e. B y C

Cuando se administrant dos drogas a la vez y una modifica los efectos de la otra:

- a. Interracion
- b. Reaccion adverse
- c. Tolerancia
- d. Resistencia

Que ocurre cuando se administra conjuntamente Dulcolax con antiacidos?

- a. La capa de azucar de Dulcolax se disuelve en el estomago, causando irritacion y vomito
- b. Los antiacidos protegen la capa de azucar de Dulcolax para que pueda ejercer mayor su efecto.
- c. La capa enteric del Dulcolax se disuelve en el estomago, causando irritacion y vomito.
- d. Aumenta el efecto del Dulcolax

Deben tomarse con mucha agua:

- a. Sulfas
- b. Quinolonas

- c. Laxantes de fibra
- d. Todas las anteriores

La ruta de administracion mas comun y conveniente es la :

- a. Parenteral
- b. Topica
- c. Oral
- d. Intramuscular

La ruta intravenosa es la preferida en situaciones de emergencia:

- a. Cierto
- b. Falso

Cual de los siguientes son sintomas de sobredosis con acetaminophen?

- a. Nausea, vomito, sensibilidad del higado
- b. Hiperactividad, sensibilidad del higado
- c. Somnolencia y confusion
- d. A y b
- e. A y c

Que ocurre cuando se administran conjuntamente las tetraciclinas con antiacidos y productos lacteos

- a. Aumenta absorcion de tetraciclinas
- b. Disminuye absorcion de tetraciclinas
- c. Puede ocurrir hemorragia y diarreas
- d. Aumenta el efecto del antiacido

Que ocurre al administrar aspirina y alcohol?

- a. Tolerancia
- b. Irritacion y hemorragias gastricas
- c. Hypotension
- d. Hypertension

Cuales de los siguientes sintomas ocurren al administrar Flagyl y alcohol?

- a. Nausea y vomito
- b. Cara roja y sudoracion
- c. Dificultad respiratoria
- d. Todas

Que ocurre al administrar aceite mineral con vitaminas A,D, E o K ?

- a. Aumenta el efecto de las vitaminas
- b. Se mantienen mas tiempo las vitaminas en el cuerpo al disolverse en el aceite
- c. Se eliminan las vitaminas al disolverse en el aceite
- d. A y B

Cuales de los siguientes deben tomarse con comida o leche?

- a. Aspirina y antiinflamatorios no esteroideos
- b. Teofilina y griseofulvin
- c. Ampicilina y tetraciclina
- d. Alternativas A y B
- e. Todas

Soluciones alcoholicas o hidroalcoholicas de materials vegetales o de sustancias quimicas:

- a. Elixirs

- b. Espiritus
- c. Emulsions
- d. Tinturas

Sistema de dos fases en el cual un liquid se dispersa en forma de gotas en otro liquid, en el cual es inmiscible y se mantienen unidos por un tercer ingrediente:

- a. Elixir
- b. Emulsion
- c. Solucion
- d. Suspension

Preparaciones que contiene particulas de una droga finalmente divididas, distribuidas de manera uniforme a traves de un vehiculo en el que la droga tiene un grado minimo de solubilidad:

- a. Elixir
- b. Emulsion
- c. Solucion
- d. Suspension

Preparacion liquida que contiene una o mas sustancias quimicas disueltas en agua:

- a. Elixir
- b. Emulsion
- c. Jarabe
- d. Solucion
- e. Suspension

Que efectos tiene la ruta de administracion en el ADME de la droga:

- a. Diferencia en la excrecion

- b. Diferencia en el metabolismo
- c. Diferencia en la absorcion
- d. Diferencia en la distribucion

Los medicamentos se administrant por las siguientes vias principales:

- a. Via oral, subcutanea y local
- b. Via parenteral, via oral, via local o topica
- c. Via intravenosa, via intramuscular, via oral
- d. Via topica, via local, via oral

La diferencia entre ruta oral y ruta intravenosa radica en:

- a. Se administra la concentracion maxima efectiva
- b. No ocurre la absorcion en la via IV (intravenosa)
- c. La via intravenosa llega directa a la sangre
- d. Todas

Las tabletas con capa enteric se caracterizan:

- a. El medicamento se absorbe en el estomago
- b. La tablet se desintegra en el intestino delgado
- c. El medicamento se absorbe en el intestino Delgado
- d. B y C

La via topica se caracteriza:

- a. Es la aplicacion de un medicamento a la piel o mucosas
- b. Por lo general, produce efecto local y no general
- c. En ocasiones puede absorberse a la circulacion sanguine

- d. Todas

Un ejemplo de una droga que se prepara en tabletas con capa enterica es:

- a. Amoxil
- b. Tagamet
- c. Ecotrin
- d. Ventolin

Cierto y Falso:

La tableta sublingual (nitroglicerina) debe ser masticada para tener un efecto mas rapido

La ruta de administracion parenteral se emplea cuando la oral esta contraindicada

La ruta preferida cuando existe una emergencia es la via intramuscular

Los acetaminofenos en sobredosis producen:

- a. Sudoracion, nausea
- b. Hiperactividad, agitacion
- c. Reaccion alergica, coma, convulsions
- d. Todas
- e. Ninguna

Una sobredosis del hierro produce:

- a. Sudoracion, nauseas
- b. Convulsiones, excitaciones
- c. Coma
- d. Vomitos de sangre, diarrea, coma
- e. Hiperactividad

Idiosincracia es el termino usado:

- a. Cuando el efecto producido es diferente al que se espera
- b. Reaccion esperada
- c. Resistencia a la droga
- d. A y B
- e. A y C

Pareo

Anfetaminas

Hierro

Tranquilizante

Antibioticos

- a. Nausea, vomito, letargo, oscurecimiento de heces fecales
- b. Rash, urticaria, edema
- c. Agitacion, convulsions
- d. Depresion respiratoria, convulsions, coma

Una sobredosis de somniferos y tranquilizantes produce:

- a. Hiperactividad, agitacion y convulsions
- b. Efectos gastrointestinales
- c. Vomitos de sangre
- d. Excitacion y calor
- e. Coma, convulsions, depresion, respiracion