

PROTOCOLO ULCERAS POR PRESION

GRADO I AL IV.

SINTOMAS

PLAN

DE

CUIDADOS

TRATAMIENTO

1ª ELECCIÓN

TRATAMIENTO

ALTERNATIVO

ERITEMA.

(no existe perdida de continuidad)

ULCERA LIMPIA.

(Ulcera superficial o profunda sin necrosis ni esfacelos).

ULCERA SUCIA.

(Ulcera superficial o profunda con necrosis y/o esfacelos).

SIGNOS DE INFECCION

(Por su aspecto, olor, exudado)

Lavar con agua y jabón.

Secar sin frotar

No antisépticos ni pomadas.

Talón: Protección sistemática.

Medidas asépticas

Limpieza con salino.

Solución antiséptica en bordes de la herida.

Medidas asépticas.

Limpieza con salino.

Agua oxigenada en úlceras malolientes y con muchos recovecos.

Medidas asépticas.

Limpieza con salino a chorro.

Obtener muestra con isopo en zona con muchos esfacelos o recovecos.

CORPITOL

TIELLE

NU-GEL

ACTISORB-PLUS

Cambios posturales

Mantener piel limpia y seca

Evitar sabanas arrugadas

Usar material ortopédico disponible

Masajear zonas de riesgo

PREVENCION

HIDROCOLOIDE

HIDROCOLOIDE

HIDROGEL

BLASTOESTIMULINA

IRUXOL-MONO

DERMISONE-TRIAANTIBIOTICA