

QUEMADURAS

Son las lesiones que se producen en los tejidos vivos debido al calor o a la acción de diversos agentes físicos o químicos.

CAUSAS:

Según la naturaleza del agente inductor, tenemos:

Líquidos en ebullición.

Objetos sólidos muy calientes o en estado de combustión.

- Por agentes térmicos

Vapores.

Radiación solar.

Acidos.

- Por agentes químicos Bases.

Fósforo.

- Por electricidad.

Rx.

- Por agentes radioactivos

Explosivos atómicos.

EVLUACIÓN DE LAS QUEMADURAS.

- Según el área superficial quemada. Esta se calcula por la regla de los 9.
- Según la profundidad de las quemaduras:

Afectación epidérmica.

- 1º grado Dolor.

Eritema.

Grosor parcial.

Afectación de epidermis y dermis.

- 2º grado Conservación de apéndices dérmicos.

Dolor.

Ampollas.

Grosor total.

Afectación de epidermis, dermis y apéndices dérmicos.

- 3º grado

Color blanquecino.

Indolora.

TRATAMIENTO

- Quemaduras de primer grado y superficie corporal quemada inferior al 15%.

1º) Limpieza con un antiséptico.

- Hibitane, uno o dos tapones disueltos en un litro de agua.
- Multidermol y agua templada produciendo abundante espuma, y luego aclarar.

2º) Secar con gasas estériles sin frotar.

3º) Aplicar un agente tópico (Silvederma spray) y dejar al aire.

*NOTA: Si el nivel cultural es bajo, sospecha de mala higiene y en los casos que la zona quemada se puede contaminar por el trabajo que realice el paciente, incluso, estas quemaduras de primer grado se harán oclusivas y aplicando Silvederma crema.

- Quemaduras de segundo grado superficiales y con superficie corporal quemada inferior al 15%.

1º) Limpieza con un antiséptico (Hibitane o Multidermol).

2º) Secar sin frotar con gasas estériles.

3º) a) Si las ampollas están rotas se hará desbridamiento de la herida con material estéril, luego lavado con suero fisiológico, secado sin frotar y luego aplicar Tulgrasaum, gasas estériles y vendaje oclusivo flojo. La cura se realizará cada 2 o 3 días y luego según su evolución.

b) Si las ampollas están conservadas, se hará buena limpieza de la zona quemada y luego con material estéril se drenan (haciendo 2 aberturas separadas en la ampolla) cogiendo zona de declive. Aplicar Betadine y hacer cura oclusiva floja a los 2 días levantarla y luego según su evolución.

- Quemaduras de segundo grado profundas y con superficie corporal quemada menor del 10%.

- Limpieza como las de segundo grado superficiales, MÁXIMA ASEPSIA
- Aplicar Linitul y encima de este Silvederma crema, gasas estériles y vendaje oclusivo flojo.

- Quemaduras de tercer grado con superficie corporal quemada en menos de un 10%. Se hará igual que en las de segundo grado profundas.

Enviar al H.G.G.; todas las quemaduras con superficie corporal quemada superior al 10 o 15%; y también se enviarán siempre que se quemen cara, manos, genitales, pies y pliegues.

OBSERVACIONES:

- Tener presente profesión del paciente.
- Nivel cultural e higiene.
- Administrar Ganmaglobulina antitetánica en las quemaduras de 2º grado, tanto en las superficiales como en las profundas.
- Advertirles que no se mojen el vendaje ni lo ensucien (guantes).
- Si la quemadura afecta a miembros mantenerlos elevados.
- Si un vendaje está pegado a la zona quemada no levantarlo en seco, se mojará con agua, teniendo en cuenta que hay que sacar primero las gasas exteriores antes de mojarlas.

Enrojecimiento de zonas próximas.

Fiebre.

- Signos inflamatorios Exudado purulento, mal olor.

Edema.

Tejidos necróticos.