

ANTIPSICOTICOS – FENOTIAZINAS

NOMBRE DEL FARMACO	MECANISMO DE ACCION	INDICACIONES YCONTRAINDICACIONES	EFECTOS TOXI
FLUFENAZINA	EJERCE POR BLOQUEO POSTSINAPTICO DE LOS RECEPTORES DOPAMINERGENICOS EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, INHIBIENDO LOS EFECTOS MEDIADOS POR DOPAMINA.	TRATAMIENTO NEUROLEPTICO POR PERIODOS PROLONGADOS.ESQUIZOFRENIA CRONICA, EN ESPECIAL EN PACIENTES CON TRASTORNOS DE CONTACTO, AUTISMO, CARENCIA DE IMPULSO VIAL,, DE PREFERENCIA ADMINISTRECE DESPUES DE QUE EL PACIENTE HA SIDO CONTROLADO CON NEUROLIPTICOS COMUNES. ESTA CONTRAINDICADAEN CASOS DE HIPERSENSIBILIDAD A LAS FENOTIAZINAS, DEPRESION DEL S. N. C. , DAÑO CEREBRAL SUBCORTICAL, EPILEPSIA, ANTECEDENTES DE DISCINESIAS, TRASTORNOS DE MEDULA OSEA, MUJERES EMBARAZADAS, PRECLAPSIA, CANCER DE MAMA, PACIENTES CO HIPERTENCION Y PRECOMATOSOS.	CONGESTION M INTRANQUILID ESTREÑIMIEN DE LOS MUSCU CUELLO Y CAR PARA CAMINAR MANOS Y DEDO EXTRAPIRAMID
PERFENAZINA	BLOQUE LOS RECEPTORES DOPAMINERGENICOS; LOS SITIOS POSIBLES DE DE MEDIACION DE ESTE EFECTO SON LOD SISTEMAS MESOLIMBICO Y MESOCORTICAL. BLOQUEA TAMBIEN LOS RECEPTORES HISTAMINERGENICOS Y SEROTONINERGENICOS.	TRATAMIENTO DE LAS PSICOSIS AGUDAS CON AGITACION PSICOMOTRIZ; EN CASOS CRONICOS CON APATIA Y NEGATIVISMO. VOMITO CAUSADO POR FARMACOS O POR RADIACION. CONTRAINDICADA EN CASOS DE HIPERSENCIBILIDAD A LAS FENOTIACINAS, PACIENTES COMATOSOS, CUANDO LOS INDIVIDUOS ESTEN BAJO EL EFECTO DEL ALCOHOL, BARBITURICOS, OPIOIDES O CUALQUIER OTRO DEPRESOR DEL S.C.N. TAMBIEN ESTA CONTRAINDICADA EN PACIENTES CON DEPRESION DE MEDULA OSEA, CANCER	VISION BORRO HIPOTENSION I CONGESTION M PALPITACIONE MANIFESTACIO EXTRAPIRAMID PARKINSONISM ACATISIA, RET PIGMENTARIA, TARDIA.

		MAMARIO, INSUFICIENCIA HEPATICA, INSUFICIENCIA RENAL, EPILEPSIA NO TRATADA, DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA.	
PIPOTIAZINA	TIENE PROPIEDADES ANTIPSICOTICAS QUE SE DISTRIBUYEN A BLOQUEO POSTSINAPTICO DE LOS RECEPTORES DOPAMINERGENICOS MESOLIMBICOS. SU EFECTO ANTIPSICOTICO SE INICIA EN 48 A 72 H.	ESQUIZOFRENIA CRONICA EN PACIENTES NO AGITADOS, ESTABILIZADOS CON NEUROLEPTICOS DE ACCION CORTA. CONTRAINDICADA EN CASOS DE DEPRESION DE LA MEDULA OSEA, DISCRASIAS SANGUINEAS, ALCOHOLISMO ACTIVO, ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR NOTABLE, ESTADOS COMATOSOS, GLAUCOMA, INSUFICIENCIA HEPATICA O RENAL, DEPRESION INTENSA DEL S.N.C. EPILEPSIA NO TRATADA.	SOMNOLENCIA ORTOSTATICA, BOCA, REDUCCION DE LA SUDACION, CONGESTION NASAL, CONSTIPACION, SOMNOLENCIA ACATASIA, MANIFESTACIONES EXTRAPIRAMIDALES, DISCINESIA TARDIA
TIOOPERAZINA	ACTUA A NIVEL DEL SISTEMA RETICULAR, DEL SISTEMA LIMBICO, DEL TALAMO Y DEL HIPOTALAMO AL BLOQUEAR LOS RECEPTORES DOPAMINERGENICOS, Y AUMENTAR EL RECAMBIO DE DOPAMINA CEREBRAL.	PSICOSIS AGUDA CON AGITACION PSICOMOTRIZ. CONTRAINDICADA EN CASOS DE DEPRESION DE LA MEDULA OSEA, DISCRASIAS SANGUINEAS, INSUFICIENCIA HEPATICA O RENAL, DEPRESION INTENSA DEL S.N.C. EPILEPSIA NO TRATADA.	CONGESTION NASAL, CONSTIPACION, MANIFESTACIONES EXTRAPIRAMIDALES, VISION BORROSA, DE BOCA, SOMNOLENCIA, DISMINUCION DE LA CAPACIDAD SEXUAL, GINECOMASTIA, DEL PERIODO MENSTRUAL, DIFICULTAD PARA HIPOTENSION, ERUPCION CUTANEA, FOTOTENDENCIA
TIORIDAZINA	SU EFECTO ANTIPSICOTICO SE ATRIBUYE A BLOQUEO POSTSINAPTICO DE LOS RECEPTORES DOPAMINERGENICOS MESOLIMBICOS. SE ABSORBE FACILMENTE A TRAVES DE LA	TRATAMIENTO DE LA ESQUIZOFRENIA, EN PARTICULAR EN PACIENTES CON COMPONENTES DEPRESIVOS Y NEGATIVISMO. PSICOSIS AGUDA, SOBRE TODO EN PACIENTES CON EXCITACION PSICOMOTRIZ, AGRESIVIDAD, AUTISMO, Y OTROS	VISION BORROSA, HIPOTENSION, CONSTIPACION, SOMNOLENCIA, DE BOCA, CONGESTION NASAL, SUDACION

	MUCOSA GASTROINTESTINAL Y DE LOS SITIOS DE ADMINISTRACION PARENTERAL.	TRANSTORNOS DE EFECTIVIDAD Y DE LA CONDUCTA.	
TRIFLUOPERAZINA	ACTUA A NIVEL DE LOS SISTEMAS RETICULAR Y LIMBICO DEL TALAMO Y DEL HIPOTALAMO, BLOQUEANDO LOS RECEPTORES DOPAMINERGICOS Y AUMENTANDO EL RECAMBIO DE DOPAMINA CEREBRAL.	PSICOSIS CRONICA CON RETARDO PSICOMOTRIZ. PSICOSIS INFANTIL EN NIÑOS HIPOACTIVOS Y DESINTERESADOS. CONTRAINDICADA EN CASOS DE DEPRESION DE LA MEDULA OSEA, DISCRASIAS SANGUINEAS, INSUFISIENCIA HEPATICA O RENAL, DEPRESION INTENSA DEL S.N.C. EPILEPSIA NO TRATADA.	CONGESTION NASAL, ESTREÑIMIENTO, MANIFESTACIONES DE VISION BORROSA, HIPOTENSION ORTOSTATICA, CONSTIPACION, SOMNOLENCIA, DIFICULTAD DE BOCA.