

- **El agujero rasgado posterior es dependencia de:**

- Hueso esfenoides.
- Hueso temporal.
- Hueso occipital.
- Hueso esfenoides y temporal, juntos.
- Hueso temporal y occipital, juntos.

- **De la laringe es correcto afirmar:**

- Es un órgano netamente fonético que está constituido por 11 cartílagos.
- Tiene relación lateroposteriormente con el P.V.N del cuello.
- La membrana tirohioidea está perforada por una rama de la laringea superior solamente.
- Entre los músculos intrínsecos están el cricotiroides, el cricoaritenoides y el glosopiglotico.
- Nda.

- **El aparato hioideo conforman:**

- Queratohioides, lig. estilomastoides y apófisis estiloides.
- Asta mayor del hioides, apófisis estiloides y lig. estilohioideo.
- Asta menor del hioides, lig. estilohioideo y estilohial.
- Estilohial, queratohial y asta mayor del hioides.
- Nda.

- **La glándula tiroides:**

- Tiene un asta mayor y una inferior.
- Tiene un istmo que une el asta mayor con el inferior.
- Pesa aprox. 45gr.
- Las paratiroides se encuentran en la cara posterointerna.
- Tiene relación externa con el P.V.N del cuello.

- **Sobre los músculos masticadores es incorrecto:**

- El músculo masetero es uno de los músculos más potentes de todo el cuerpo.
- El temporal se inserta por debajo de la cara interna de la apófisis coronoides.
- El pterigoideo interno, tiene fibras dirigidas a la cara interna de la apófisis ascendente del maxilar inferior.
- El pterigoideo externo se inserta en la cara externa de la lámina interna de la apófisis pterigoides.
- Al músculo buccinador se le considera un músculo masticador secundario o accesorio por formar parte de la pared de la boca, interviniendo de esta forma en la masticación.

- **De la faringe es incorrecto afirmar:**

- La orofaringe tiene comunicación con la trompa auditiva.
- La rinofaringe esta limitada por delante por las coanas.
- Tiene contacto directo con la apófisis palatina del maxilar superior.
- Las amígdalas tubáricas forman parte de la pared lateral.
- Dos son incorrectas. _____ y _____

- **Las siguientes estructuras pasan por el agujero yugular:**

- Hipogloso.
- Maxilar inferior, rama del trigémino.
- Raíces espinales del nervio espinal.
- La arteria menárgea posterior, rama de la maxilar interna.
- Nda.

- **Marca la opción correcta:**

- La glándula sublingual pesa 6-7gr y su conducto es el de Rivinius.
- La glándula parótida tiene un conducto (Stensen) que recorre la cara externa del masetero, antes de desembocar en el vestibulo.
- El conducto submentoniano desemboca a nivel del 2º molar superior.
- La glándula submentoniana o submandibular tiene un conducto llamado de Wharton.
- La parótida es considerada la glándula salivar mayor, por su mayor tamaño; la submentoniana y la

submandibular son accesorias porque son más pequeñas.

- **De los músculos de la boca es incorrecto afirmar:**

- Su inervación motora, está dada por el facial.
- Se caracterizan por tener una inserción sea y otra tegumentaria.
- El triangular de los labios, el cuadrado del mentón y la borla del mentón son depresores de los labios.
- Sensitivamente los cigomáticos están inervados por el nervio maxilar superior.
- Nda.

- **La lengua:**

- Es un órgano no vil que se encuentra fijo por el frenillo de la lengua.
- Tiene 17 músculos, de los cuales el único músculo extrínseco es impar.
- El único músculo impar de la lengua es el palatoestafilino (músculo de la vula).
- Su inervación motora esta dada por el XII par.
- Su vascularización esta asegurada por ramas del dentario inferior.

- **De las vértebras cervicales podemos afirmar:**

- Por los agujeros transversos pasan la art. vertebral, la v. vertebral y el n. de Francois Frank.
- Son 7 y se corresponden cada una con una raíz espinal.
- Una característica particular es la apofisis odontoides del atlas que se articula con la carilla correspondiente que le provee el axis.
- El tubérculo de Chassaign se observa en la C6.
- Dos son correctas. _____ y _____.

- **Son músculos infrahioideos:**

- ECM, esternotiroideo y esternocleidohioideo.
- Esternotiroideo, omohioideo y digástrico.
- Esternocleidohioideo, tirohioideo y omohioideo.
- T.l.a.
- Dos son correctas (especificar cuales).

- **Tiene doble inervación motora:**

- Risorio.
- Digástrico.
- Milohioideo.
- Palatoestafilino.
- Nda.

- **La arteria facial, excepto:**

- es rama de la carótida externa
- da ramas a las glándulas submaxilar y sublingual
- su rama Terminal es la ranina
- su rama Terminal se anastomosa con una proveniente de la carótida interna.
- Nda

- **Son ramas de la a. maxilar interna, excepto:**

- temporal profunda anterior
- temporal profunda media
- temporal profunda posterior
- temporal superficial
- dos son correctas _____ y _____
- todas
- nda

- **Sobre la vascularización de la glándula tiroides**

- está dada por la a. facial, rama de la carótida externa
- por la a. facial, rama de la carótida interna
- a. tiroideas anterior, media y posterior.
- A. tiroidea superior, rama de la carótida externa; e inferior, rama de la subclavia.
- A. tiroidea superior, rama de la carótida externa; e inferior rama de la carótida primitiva.

- Dos son correctas: _____ y _____
- **Sobre la arteria carótida primitiva**
- forma parte del PVN del cuello, y la del lado derecho es más larga.
- Se bifurca a nivel del triángulo de Pirogoff dando las arterias carótidas externa e interna.
- A su inicio la carótida interna se ubica hacia fuera dando ramas para el cuello.
- Se bifurca en el borde superior del cartílago tiroides
- 2 son correctas: _____ y _____
- Todas las anteriores
- Nda
- **Son componentes del ramillete de riojano.**
- músculos estilofaríngeo, estilomaxilar, estilohioideo y ligamentos esfenomaxilar y estilohioideo
- músculos estilofaríngeo, estilohioideo, estilogloso, y los ligamentos estilohioideo y estilomaxilar
- músculos estilofaríngeo, estilohioideo, estilogloso y los ligamentos estilohioideo y estilopalatino.
- Nda.

19. la glándula parótida está innervada.

- anatômicamente por el maxilar superior y funcionalmente por el glosofaríngeo.
- anatômicamente por el auriculotemporal y funcionalmente por el glosofaríngeo.
- anatômicamente por el glosofaríngeo y funcionalmente por el auriculotemporal.

20. Los músculos infrahioideos innervados por el asa cervical son, excepto.

- omohioideo
- tirohioideo
- esternocleidohioideo.
- esternotiroideo.

21. La membrana tirohioidea se encuentra atravesada por:

- a. laringea sup. y ramo interno del n. laringeo sup
- a laringea sup y ramo externo del n laringeo sup
- a laríngea inf y ramo interno de del n laringeo sup
- a. tiroidea sup y n laringeo recurrente
- a. tiroidea inf y n laríngeo recurrente

22. elementos que atraviesan la glándula parótida

- n. facial, a carótida interna, v. yugular int.
- n. trigémino, ramos colaterales de la carótida externa y vena yugular externa.
- n. facial, ramos terminales de la carótida externa y la formación de la vena yugular externa.

d. nda.

23. sobre el nervio trigémino.

a- es el VI par craneal y sus ramas son la oftálmica, el maxilar superior y el inferior.

b. es el VII par craneal y sus ramos principales se dividen después de partir del ganglio de Gasser.

c. el n maxilar inferior es su rama más compleja

d. nda

24. Sobre el plexo cervical.

a. formado por las raíces anterior de las primeras 4 raíces cervicales.

b. se halla dividido por 2 grupos: superficial y profundo.

c. el nervio frénico es el más importante del plexo cervical profundo.

d. todos son correctos

e. nda.

25. Elementos que atraviesan la hendidura esfenoidal.

a. III, IV, V pares, vena oftálmica, nervio oftálmico.-

b. III, IV, VII pares, vena yugular interna y arteria facial

c. III, IV, VI pares, nervio maxilar superior y vena meníngea media.

d. todas son correctas.

26. Respecto a los linfáticos del cuello.

a. los principales grupos del collar ganglionar pericervical son el occipital, el mastoideo, el parotideo, el submandibular y el submentoniano.

b. el ganglio de Cosmer es también conocido como supraesternal.

c. Los principales ganglios de la cadena horizontal inferior son el supraesternal y el supraclavicular.

d. los grupos ganglionares retrofaríngeos no corresponden necesariamente a los ganglios del cuello.

e. todas son correctas.

f. dos son correctas _____ y _____

27.Cuál no es un elemento que constituye el triángulo de Farabeuf.

a. v. yugular interna

- b. v. yugular externa.
- c. t. tirolinguofaringofacial
- d. n. espeinal
- e. n. hipogloso mayor
- f. dos son correctas: _____ y _____

28.Sobre el punto de Herbs:

- a. se encuentra en el punto equidistante en el borde anterior del ECM
- b. se encuentra en el punto equidistante en el borde posterior del ECM
- c. es le punto donde el n. hipogloso mayor da sus ramas.
- d. es le punto donde el plexo cervical superficial da sus ramas
- e. dos son correctas: _____ y _____
- f. todas

Simulacro de Examen Parcial de Cuello y Cabeza

Anatomía Descriptiva, Topográfica y Funcional

Nombres: _____