

EXAMEN DE PARASITOLOGIA (JRo)

• Género shistosoma

Órganos de fijación del adulto **VENTOSAS**

Hospedador intermediario (HI) **CARACOL ACUATICO**

Fase que accede al HI **MIRACIDIO**

Fases que se desarrollan en el HI **SPOROCISTO, CERCARIA**

Hospedadores definitivos **UN VERTEBRADO (HOMBRE, VACA)**

Fase que accede al HD **FURCOCERCARIA**

Vía de entrada en el HD **PIEL**

• Género Phlebotomus

Color **AMRILLO OCRE CLARO**

Forma del tórax **MUY PILOSO Y GIBOSO**

Forma de las alas **LANCEOLADAS**

Ambiente en donde se puede encontrar **AMBIENTES RURALES**

Cubijos diurnos **OQUEDADES DE LAS PAREDES DE LAS CASAS**

Se encuentran en plantas bajas de las casa porque **SON MALOS VOLADORES**

Ciclo terrestre **HEMBRA-HUEVOS-LARVA1-LARVA2-PUPA**

3. Género Simulium

LARVAS

Lugar de fijación **SUPERFICIE DE PIEDRAS Y VEGETALES**

Habitan en aguas **RAPIDAS, TURBULENTAS Y LIMPIAS**

ADULTO

Lugares frecuentados por ellos **AFRICA, EN RIOS**

Época del año **PERIODO DE LLUVIAS**

Influencia en su densidad de:

- Las altas temperaturas estivales **DISMINUYE**
- La contaminación de los ríos **DISMINUYE**
- La limpieza de los mismos **AUMENTA**

4. Género Cúlex, Anopheles y Aedes

MACHO Y HEMBRA

Se diferencian en

Estímulo que detectan del hospedador **CALOR**

FASES ACUÁTICAS

Tipo **HUEVO-LARVA-PUPA**

Aguas que frecuentan **TRANQUILAS**

Factor que ha favorecido su disminución in the city **COTAMINACION DE LOS RIOS**

- **Género Giardia y Género Trichinella**

Giardia

Fases del ciclo **TROPOZOITO Y QUISTE**

En condiciones adversas adopta la forma **QUISTE**

Trichinella

Ruta de salida **HECES**

En el hospedador homeotermo las larvas se encuentran en **MUSCULOS ESTRIADOS**

- **Ixódidos (Garrapatas) y Argásidos**

Ixódidos

Órgano de fijación **HIPOSTOMA**

Tipos de estadíos inmaduros **PROTONINFA, DETEURONINFA Y TRITONINFA**

Estímulo que reconocen del hospedador **INSOLACION**

Especificidad: Alta o Baja **BAJA**

Transmisores: Buenos o Malos **BUENOS**

Argásidos

Citar un hábitat común **LUGARES HUMEDOS**

- **Dermanyssus Gallinae**

Citar 2 medidas de control en una parasitación de aves domésticas:

a) **LIMPIEZA DE JAULAS**

b) **TAPAR GRIETAS DE PAREDES EN DONDE ESTEN**

- **Demodex spp.**

Hábitat **FOLICULO PILOSO**

Sarcoptes spp.

Lesión típica **SARNA SARCOPTICA (GALERIAS BAJO LA PIEL)**

Trombicula spp.

Fase del ciclo parásita **ESTADIOS LARVARIOS**

- **Pediculus Humanus**

Forma del cuerpo **APLASTADO**

Órgano de fijación **UÑA Y ESPOLON**

Especificidad de hospedador: Alta o baja **ALTA**

El ciclo se desarrolla **HOSPEDADOR**

Phthirus pubis

Prefiere regiones del cuerpo **POCO POBLADAS DE PELO**

- **Género Pulex**

Forma del cuerpo **APLASTAMIENTO LATERAL**

Forma de la cabeza **QUILLA**

Localización de las antenas **HUECOS ANTENALES**

Estímulo que reconocen del hospedador **VIBRACIONES AL PISAR**

El ciclo se desarrolla **SUELO**

Citar 1 medida de control **LIMPIAR LOS SUELOS**

- **Taenia Solium T. Saginata**

Hábitat del adulto **INTESTINO**

Estadio larvario **CYSTICERCO**

HI de T. Solium **CERDO, HOMBRE**

HI de T. Saginata **VACA, JIRAFÁ**

Característica biológica de los huevos **EMBRION HEXAGANCHO**

Echinococcus Granulosus

HD **PERRO (CANIDOS)**

HI **HERVIBORO**

HI accidental **HOMBRE**

- **Género Balantidium**

Órganos de locomoción **CILIOS**

Fases que presenta en el ciclo **TROFOZOITO Y QUISTE**

Reservorio **CERDO**

Medida de educación ambiental **BUENA ALIMENTACION Y LIMPIEZA**

- **Naegleria Fowleri**

Agente productor de **MEAP (MENINGITIS)**

Hábitat común del parásito **AGUA SALADA**

Una medida de control **FILTRACION DEL AGUA, OSCURIDAD**

- **Familia Endamoebidae**

En las amebas parásitas los quistes sirven para:

a) **DISPERSION**

b) **REPRODUCCION**

c) **RESISTENCIA**

- **Fasciola Hepática**

Órganos de fijación **VENTOSA**

HD **RUMIANTES**

Fases en HD del parásito **METACERCARIA**

HICARACOL

Fases en HI del parásito **ESPOROCISTO, REDIA, CERCARIA**

Fases en el ambiente del parásito

Forma de dispersión **METACERCARIA**

Localización de la misma **HIERBA**

Vía de entrada de esta fase en el HD **INGESTION POR OVEJAS**

- **Diphylobothrium Latum**

Importancia de los hospedadores paraténicos:

a) **HOSPEDADOR DE TRANSPORTE O ESPERA**

b) **ACERCA EL HI AL HD**

¿Cómo se parasita el HD? **VISCERAS DE PESCADO**

Localización del adulto **INTESTINO**

Tipos de estadíos larvarios **PLEROCERCOIDE, PROCERCOIDE**

Localización de los mismos **CRUSTACEO, PEZ**

- **¿Cómo influyó la vida parásita en?**

Tamaño **ECTOP. NO HAY DIFERENCIA; ENDOP. HAY DIFERENCIA**

Color **ECTOP. COLORES BRILLANTES; ENDOP. TRANSPARENTES**

FORMA DEL CUERPO

Trichuris Trichiura **GRAN MODIFICACION DEL CUERPO**

Órganos de fijación **ESPICULA**

Dicrocoelium Dentriticum **VENTOSA ORAL**

Dipylidium Caninum **ESCOLEX (GANCHOS Y VENTOSAS)**

ÓRGANOS DE LOCOMOCIÓN

Melophagus Ovinus **ALAS REDUCIDAS Y PATAS CADA VEZ MAS POTENTES**

- **Efectos de la vida parásita sobre la reproducción**

Género Plasmodium

Hospedador vertebrado**ANIMALES SANGRE CALIENTE Y**

Forma de reproducción**ASEXUAL**

Fases del parásito**ESPOROZOITO, , MEROZOITO**

Localización**HIGADO, GLOBULOS ROJOS**

Hospedador invertebrado**MOSQUITO ANOPHELES**

Formas de reproducción**ASEXUAL Y SEXUAL**

Fases del parásito**GAMETozoITO, ZIGOTO,**

Localización**ESTOMAGO, GLANDULAS SALIVALES,**

- **Efectos del parásito sobre el hospedador**

Ancylostoma Duodenale

ADULTO

Órganos de fijación**DIENTES LARGOS Y CAPSULA BUCAL**

Alimentación**FIJA A PARED INTESTINAL**

LARVAS

Fase infestante**FILARIFORME**

Vía de penetración**PIEL**

Ascaris Lumbricoides

Localización de los adultos**INTESTINO**

Lugar de maduración de los huevos**SUELO**

Características de este hábitat**CALIDO Y HUMEDO**

Lugar de maduración de los huevos de:

Género Toxocara**SUELO**

Género Trichuris**SUELO**

Género Enterobius**NIÑO**

Principal medida de control en Ascaris

Principal medida de control en Enterobius

- **Género Cimex**

Citar una característica biológica **FOTOFOBICOS**

MIASIS

En el diagnóstico se utilizan **LARVAS EN HECES**