

REACTIVOS PARA EXAMEN DEPARTAMENTAL 2003 DE GERIATRÍA

- La función del tracto urinario inferior se encuentra conservada, pero situaciones externas precipitan la

incontinencia

a) incontinencia por rebosamiento b) Incontinencia de urgencia c) Incontinencia de estrés d) Incontinencia funcional e) Incontinencia transitoria

- También conocida como inestabilidad del detrusor, es el tipo de incontinencia urinaria mas frecuente (65% de los casos) entre las personas mayores

a) incontinencia de urgencia b) Incontinencia de estrés c) Incontinencia funcional d) Incontinencia transitoria e) Incontinencia por rebosamiento

- Presión normal en el sistema venoso capilar cutáneo

a) 5 mmHg b) 12 mmHg c) 21 mmHg d) 35 mmHg e) 47 mmHg

- Cuando se excede la presión en el sistema venoso capilar cutáneo se interfiere en el retorno venoso, lo que da por resultado, excepto:

a) Edema b) Activación del plasminogeno c) Anoxia hística d) Autolisis e) Exudado capilar.

- Estadío de la formación de una ulcera en la que se encuentran extensión de la ulcera hacia el tejido celular subcutáneo

a) estadio I b) estadio II c) estadio III d) estadio IV e) estadio V

- El fundamento fisiológico de la corrección de las anomalías nutricionales para la curación de las úlceras por decúbito es:

a) aumentar la síntesis de colágeno b) aumentar la síntesis de mioglobina c) acelerar la descamación epitelial d) incrementar la neovascularización e) retardar la colágeno lisis

- En el viejo una causa frecuente de anorexia con estado de ansiedad son manifestaciones precoces de:

a) estados hiperactivos b) depresiones y psicosis c) trastornos bipolar d) esquizofrenia e) demencia senil

- Fármacos asociados a anorexia en los ancianos

a) benzodiacepinas y sales de litio b) sedantes y digitálicos c) IECAS y aspirinas d) betabloqueadores y diuréticos e) todas las anteriores

- Es la forma mas común de sordera, bilateral simétrica y se inicia poco después de los 50 años.

a) tinnitus b) hipoacusia c) sordera súbita d) prebiacusia

- Los diferentes tipos de desequilibrio hidroelectrolítico en el paciente geriátrico son, EXCEPTO:

a) Edemas b) disminución de volumen c) distribución anormal del líquido extracelular d) hiperosmolaridad intracelular

• Son causas de aumento de expansión volumétrica en el organismo, EXCEPTO:

a) disminución de electrolitos y proteínas en el plasma b) ingesta excesiva de K c) ingesta excesiva de sal d) administración excesiva de agua

• La complicación más grave de un síndrome de hiponatremia en el paciente geriátrico es:

a) insuficiencia cardíaca b) anasarca c) Edema cerebral d) insuficiencia renal crónica

• Son síntomas de presbiacusia de tipo periférico:

a) Pérdida auditiva de tonos puros y del lenguaje así como problemas de comprensión.

b) problemas para localizar sonidos y escuchar de forma bilateral.

c) problemas de lenguaje difícil y del habla.

d) todas las anteriores

e) ninguna de las anteriores.

• Factores que predisponen al desarrollo de cáncer de páncreas, excepto:

a) pancreatitis crónica b) diabetes mellitus c) dieta rica en grasas d) tabaquismo e) esclerosis múltiple.

• Cambios fisiológicos músculo esqueléticos que con el envejecimiento pueden causar síndrome de inmovilidad, EXCEPTO

a) disminución de masa y fuerza muscular b) disminución de la velocidad de la contracción muscular

c) marcha senil d) disminución de la sensibilidad propioceptiva y vibratoria.

• Se ha demostrado que el filtrado glomerular disminuye en promedio:

a) 0.90ml/min por año b) 0.90ml/min por día c) 0.75ml/min por año d) 0.80 ml/cada 6 meses.

• que presión constante es necesaria para producir lesiones histicas irreversibles

a) 20 mmHg b) 70 mmHg c) 35 mmHg d) 90 mmHg d) < 2 mmHg

• Las fuerzas de corte y fricción producen los siguientes efectos, EXCEPTO:

a) estiramiento y angulación de vasos b) edema pericapilar c) intensas fuerzas de corte en la zona profunda de la fascia superficial. d) trombosis y socavado de la dermis e) eliminación del estrato córneo protector de la superficie.

• De los siguientes elementos señale los que aceleran la caries.

a) cobre, selenio, plomo, magnesio y cadmio b) bromo, aluminio y magnesio c) cadmio, vanadio, hierro

d) estroncio, bromo y aluminio e) bario, aluminio y bromo

- La geriatría es la rama de la medicina que estudia los aspectos, EXCEPTO:

a) clínicos b) preventivos c) terapéuticos d) sociales e) genéticos.

- Cuadro clínico principal del cáncer pancreático

a) ictericia, y dolor b) ictericia y ascitis c) desnutrición y hepatomegalia d) ictericia, dolor y ataque al estado general e) diarrea y dolor

- Desde el punto de vista funcional, el sistema auditivo se divide en :

a) cortical, parietal. Periférica b) periférica, del tallo encefálico y cortical. d) medular y periférica c) central y periférica e) parietal, medular y periférica.

- Factores que influyen en la formación de los cálculos biliares , excepto:

a) disminución del vaciado b) concentración de bilis c) rapidez del vaciado d) infecciones e) formación del moco

- En los ancianos causa diuresis osmótica puesto que aumenta la osmolalidad del fluido tubular e impide la reabsorción de agua y electrolitos:

a) diuréticos osmóticos. B) manitol c) glucosas e) expansores de plasma e) furosemide

- Son aquellas cefaleas debida a estados de ansiedad, depresión, etc.

a) de origen intracerebral b) de origen extracerebral c) de origen infeccioso

d) psicógenas o tensionales e) ninguna de las anteriores.

26-Menciona ¿Cuál de los siguientes cambios anatómicos de la vesícula biliar no corresponden a la vejez?

a) hipertrofia muscular b) mucosa atrofica c) hipotrofia de la musculatura d) esclerosis de los vasos que irrigan a la vesícula e) ninguna de las anteriores

27.-Patología en la cual se observa dolor episódico, inflamación aguda o ictericia, colangitis y pancreatitis.

A) divertículos b) hepatitis c) gastritis d) colecistitis e) colelitiasis

28.-Estudio de gabinete más útil para el diagnóstico de diverticulosis.

a) TAC b) Rx simple c) Endoscopia d) USG e) colon por enema con doble contraste

29.- ¿Cómo se clasifican las hernias hiatales?

a) primarias y secundarias b) esofagogastricas, paraesofagica y mixta c) Bochdalek y de Morgagni d) inguino superficial y complejas e) de la línea alba y Coper.

30.-¿Cuál de las siguientes enfermedades no entran en el diagnóstico diferencial de la hernia diafragmática?

a)esofagitis medicamentosa b)carcinoma de esófago c)angor pectoris d)ulcera péptica e)absceso pulmonar.

31.-Es un factor que interviene en la etiopatogenia de hernia diafragmática.

a)sedentarismo b)consumo prolongado de aspirina c)obesidad d)desnutrición e)todas las anteriores

32.-Las siguientes medidas forman parte del tratamiento médico de la hernia hiatal, excepto:

a)evitar el tabaco y el alcohol b)medidas posturales c)antiácidos, antibióticos

d)fundoaplicadura gástrica de Niessen d)medidas dietéticas

33.-Según las estadísticas, el 80% de las úlceras gástricas son causadas por la bacteria:

a)Malasezia furfur b)Salmonella c)E. Coli d)Helicobacter Pylori e)ninguna de las anteriores

34.-Estudio para confirmar la presencia de úlcera gástrica:

a)TAC abdominal b)ultrasonido c)tele de tórax d)endoscopia e)ninguna de las anteriores

35.-¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de la úlcera gástrica?

a)peritonitis b)hematoquezia c)perforación y sangrado d)a y c e)ninguna de las anteriores

36.-Entidad clínica que agrupa a una serie de enfermedades cuya característica fundamental es la

incapacidad del tubo digestivo para absorber grasas, proteínas, carbohidratos, minerales y vitaminas

a)síndrome de Chron b)colitis c)colitis ulcerosa d)síndrome de Cushing e)síndrome de absorción intestinal deficiente

37.-Mecanismos que pueden ocasionar síndrome de absorción intestinal deficiente, excepto:

a)alteración en el transporte b)alteración intraluminal c)alteraciones en la pared intestinal

d)alteraciones en el colon ascendente e) a y c

38.-Se considera la prueba de oro, para el diagnóstico del síndrome de absorción intestinal deficiente:

a)cuantificación de de caroteno b)cuantificación de grasa c)método cualitativo de grasas

d) b y c e)cualificación de grasas

39.-Diagnóstico diferencial de colitis isquémica crónica , excepto:

a)perforación intestinal b)obstrucción intestinal c)volvulopatias b)embarazo ectópico e)ninguna de las anteriores

40.–En caso de irritación peritoneal, o deterioro clínico se debe proceder a:

- a) aumentar la dosis de esteroides b) realizar colonoscopia c) tratamiento con metrotexate**
- d) laparotomía exploradora e) tratamiento con interferon gamma.**

41.–Son contraindicaciones de cirugía en la colitis isquémica:

- a) onicomicosis b) arritmias c) insuficiencia cardíaca congestiva d) pacientes inestables e) b y c**

42.–Tratamiento médico de primera elección en colitis ulcerosa:

- a) prednisona b) ciproflaxacina c) paracetamol d) metotrexate e) acetaminofen**

43.–¿En la colitis ulcerosa qué región anatómica es la más comprometida?

- a) recto b) esófago c) yeyuno d) duodeno e) íleon**

44.–¿Es complicación de la colitis ulcerosa?

- a) anemia aplásica b) estreñimiento c) megacolon tóxico d) anemia de células falciformes e) b y c**

45.–Edad de mayor presentación de cáncer de páncreas

- a) más de 70 años b) 40 años c) 60–65 años d) 65 a 70 años e) 70 años**

46.–Los siguientes datos radiológicos: estreches, ulceraciones de la mucosa, distensión colónica sugieren:

- a) Esprue tropical b) colitis isquémica C) colitis d) isquemia mesentérica inferior e) isquemia mesenterica superior**

47.–Cambios cardiovasculares durante la vejez , excepto:

- a) aumento de la presión arterial b) rotación de AQRS a la derecha en el electrocardiograma c) aumento de la rigidez arterial d) aumento de la rigidez valvular e) pérdida de células miocárdicas**

48.–Cambios en el aparato genitourinario, excepto:

- a) hipogonadismo b) crecimiento de la próstata c) atrofia y sequedad de la mucosa vaginal**
- d) disminución de la capacidad vesical e) aumento de la capacidad vesical**

49.–Cambios más sobresalientes en el sistema endocrino durante la vejez:

- a) intolerancia a la glucosa b) disminución de la actividad tiroidea c) disminución de la actividad suprarrenal d) ninguna de las anteriores e) a , b, c**

50.–Cambios en la función respiratoria durante la vejez , excepto:

- a) tensión arterial del O₂ disminuida b) tensión venosa del O₂ disminuida c) rigidez de la caja torácica**
- d) disminución del rebote elástico pulmonar e) debilitamiento de los músculos respiratorios**

1.- A 2.-A 3.-B 4.-B 5.-C 6.-A
7.- B 8.-B 9.-D 10.-D 11.-B 12.-C
13.-A 14.-E 15.-D 16.-C 17.- B 18.-B
19.-A 20.-E 21.-D 22.-B 23.-A 24.-A
25.-D 26.-C 27.-E 28.-E 29.-B 30.-E
31.-C 32.-D 33.-D 34.-D 35.-C 36.-E
37.-D 38.-B 39.-B 40.-D 41.-A 42.-A
43.-A 44.-C 45.-D 46.-B 47.-B 48.-E
49.-E 50.-B