

EXAMEN DE ANATOMIA PATOLOGICA

1.- ¿Cuál de los siguientes tumores tiende a diseminarse precozmente por Vía sanguínea?

- a)Carcinoma de riñón.
- b)Carcinoma folicular tiroideo.
- c)Carcinoma prostático.
- d)Todos los anteriores.
- e)Ninguno de los anteriores.

2.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta acerca de los tumores de células de Bürthle del tiroides?

- a)Es una metaplasia de células oxifílicas.
- b)Es frecuente la atipia nuclear.
- c)Puede corresponder a un adenoma folicular.
- d)Puede corresponder a un carcinoma folicular.
- e)Tiene peor significado pronóstico.

3.- Una tumoración dolorosa de localización predominantemente subungueal, cuya histología muestra un aspecto vascular sólido o quístico puede corresponder a un :

- a)Sarcoma de Kaposi.
- b)Tumor glómico.
- C)Higroma.
- d)Hemangioendotelioma.
- e)Cordoma.

4.- El tumor urotelial (transicional) es un buen ejemplo de tumoración:

- a)Multicéntrica.
- b)Unica.
- c)Infrecuente.
- d)Metaplásica.

e)Clonal.

5.- Los carcinomas metastatizan generalmente en los tejidos y organos que se mencionan excepto en:

a)Hígado.

b)Músculo esquelético.

C)Hueso.

d)Cerebro.

e)Riñón.

6.- El elemento celular más abundante en las lesiones de la sífilis,tanto en el periodo primario como en el secundario es:

a)Células de Langhans.

b)Célula epitelioides.

c)Linfocito.

d)Célula plasmática.

e)Histiocito.

7.- ¿En cuál de los siguientes tipos de carcinomas se suele demostrar inmunohistoquímicamente la presencia del antígeno carcino-embrionario (CEA)?

a)Carcinoma broncopulmonar.

b)Carcinoma mamario.

c)Carcinoma medular de tiroides.

d)Carcinoma de colon.

e)En todos ellos.

8.- ¿En cuál de los siguientes elementos (neoplásicos o no) NO se suele demostrar inmunohistoquímicamente filamentos intermedios de Desmina?

a)Células epiteliales.

b)Fibroblastos.

c)Células musculares.

d)Células de Schwann.

e)Células gliales.

9.- ¿Cuál de las siguientes lesiones o entidades patológicas tiene autentico carácter de lesión precancerosa en la mama?

- a)Fibroadenoma.
- b)Mastopatía quística.
- c)Mastopatía fibrosa.
- d)Metaplasia apocrina.
- e)Adenosis esclerosante.

10.- El tumor hepático mas frecuente en pacientes a los que se ha administrado Thorotrast es:

- a)Linfoma
- b)Hepatocarcinoma.
- c)Colangiocarcinoma.
- d)Angiosarcoma.
- e)Fibrosarcoma.

11.- El meduloblastoma es un tumor cuya localización más frecuente es:

- a)Médula espinal.
- b)Médula ósea.
- c)Hemisferios cerebrales.
- d)Vermis cerebeloso.
- e)Médula suprarrenal.

12.- El término anatomoclínico de microcarcinoma (aplicado a tiroides, mama ect) se refiere a un tumor invisible clínicamente que tiene menos de :

- a)Una micra.
- b)Un milímetro.
- c)5 milímetros.
- d)Un centímetro.
- e)3 centímetros.

13.- La lesión hepática secundaria a un By-pass intestinal se asemeja a:

a) Enfermedad hepática alcohólica.

b) Cirrosis biliar.

c) Hepatitis viral aguda.

d) Hepatitis crónica persistente.

e) Hepatitis crónica agresiva.

14.- Se han descrito factores hereditarios, transmitidos por herencia mendeliana, en las siguientes neoplasias excepto en una:

a) Poliposis cólica familiar.

b) Retinoblastoma.

c) Neurofibromatosis.

d) Adenomatosis endocrina múltiple.

e) Carcinoma gástrico.

15.- ¿Cuál de los siguientes tipos de carcinomas de pulmón tiene un tiempo de duplicación más corto?

a) Carcinoma epidermoide.

b) Carcinoma bronquiolo-alveolar.

c) Carcinoma microcítico.

d) Adenocarcinoma.

e) Carcinoma de células gigantes.

16.- Los cristales de Charcot-Leyden son estructuras microscópicas que se pueden encontrar en el esputo del paciente con:

a) Neumonía lobar.

b) Atelectasia.

c) Carcinoma broncopulmonar en grano de avena.

d) Asma bronquial.

e) Bronconeumonía.

17.- ¿En cuál de los siguientes tumores es posible observar el fenómeno de maduración hacia formas benignas?

a) Carcinoma prostático.

b)Linfoma de Burkitt.

c)Carcinoide bronquial.

d)Neuroblastoma.

e)Mieloblastoma de células gronulosas.

18.– La presencia de metastasis solitaria en pulmones sugiere:

a)Hepatocarcinoma.

b)Carcinoma renal.

c)Carcinoma de mama.

d)Carcinoma tiroideo.

e)Coriocarcinoma.

19.– La lesión más característica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva es:

a)Hemorragia medular.

b)Engrosamiento de la membrana basal.

c)Glomerulonefritis exudativa.

d)Lesión necrotizante.

e)Formación de semilunas epiteliales.

20.– ¿Cuál de los siguientes tumores nunca metastatizan?

a)Tumores cerebrales.

b)Tumores cutáneos.

c)Carcinoide intestinal.

d)Cistadenocarcinoma ovárico borderline.

e)Todos los anteriores.

21.– ¿Es la célula de Reed–Stenberg un elemento patognomónico de la enfermedad de Hodgkin?

a)Si en un contexto histológico de enfermedad de Hodgkin.

b)No, en absoluto.

c)Es tan sólo una célula histiocitaria reactiva.

d)Es una célula linfoide reactiva.

e)Es típica de cualquier linfadenitis.

22.- ¿Cuál de los siguientes tumores no debe ser considerado como un tumor mixto?

a)Adenoma pleomorfo de glándula salival.

b)Fibroadenoma mamario.

c)Coriocarcinoma.

d)Tumor mesodérmico uterino con componente heterólogo.

e)Hepatoblastoma.

23.- ¿Cuál de los siguientes tumores NO es el tumor maligno primario más común en el órgano que se menciona?

a)Glioma de cerebro.

b)Leiomioma de útero.

c)Osteosarcoma de hueso.

d)Carcinoma escamoso de lengua.

e)Carcinoma de células transicionales de vejiga.

24.- ¿Cuál de los siguientes ejemplos de linfomas no Hodgkin ocurren más frecuentemente en niños?

a)Centrocítico difuso.

b)Folicular.

c)Histiocítico intestinal.

d)Linfoblástico.

e)Linfocítico.

25.- En los estudios postmortem las lesiones ateromatosas son más marcadas a nivel de:

a)Aorta ascendente.

b)Arterias carótidas primitivas.

c)Mitad inferior de aorta abdominal.

d)Arteria pulmonar.

e)Arterias retinianas.

26.- ¿Cuál de los siguientes procesos o circunstancias no debe ser considerado como factor de riesgo del cáncer de endometrio?

- a)Obesidad.
- b)Hipertension.
- c)Perimenopausia.
- d)Promiscuidad sexual.
- e)Hiperestronismo endógeno.

27.- Los aneurismas sifilíticos de la aorta se encuentran mas frecuentemente en:

- a)Justo encima de la bifurcación abdominal.
- b)En la porción abdominal, debajo del diafragma.
- c)Zona torácica justo encima del diafragma.
- d)Porción ascendente del cayado aortico.
- e)Porción descendente del cayado aortico.

28.- Son causas conocidas de fibrosis intersticial difusa de pulmón todas las siguientes menos una:

- a)Sarcoidosis.
- b)Asbestosis.
- c)Artritis reumatoide.
- d)Tabaquismo.
- e)Bleomicina.

29.- La enfermedad más frecuentemente asociada con lo osteoartropatía hipertrófica es:

- a)Mesotelioma pleural.
- b)Carcinoma broncogénico.
- c)Endocarditis infecciosa.
- d)Enfermedad cardiaca congénita.
- e)Colitis ulcerosa.

30.- La causa más frecuente de muerte como consecuencia de una hipertensión sistémica es:

- a)Traumatismo.

b)Ruptura de aneurisma aortico.

c)Fallo cardiaco.

d)Fallo renal.

e)Ruptura de aneurisma en mora.

31.- En la nueva formulación de los linfomas no Hodgkin, ¿cuál de los siguientes tipos debe de ser considerado como de alto grado?

a)Linfoma difuso de grandes y pequeñas células.

b)Linfoma folicular de células grandes.

c)Linfoma folicular de células hendidas grandes y pequeñas.

d)Linfoma linfocítico.

e)linfoma linfoblástico.

32.- La diabetes mellitus se asocia con todas las alteraciones renales que se mencionan excepto una:

a)Glomeruloesclerosis difusa.

b)Glomeruloesclerosis nodular.

c)Arteriosclerosis renal.

d)Necrosis tubular aguda.

e)Pielonefritis aguda.

33.- Sólo uno de los linfomas enumerados a continuación no está formado por linfocitos B:

a)Linfoma nodular.

b)Linfoma de Burkitt.

c)Micosis fungoide.

d)Linfoma linfoplasmocitario.

e)Inmunosarcoma.

34.- ¿cuál de las siguientes lesiones tiene mejor pronóstico?

a)Léntigo maligno.

b)Léntigo maligno-melanoma.

c)Melanoma de crecimiento superficial.

d)Melanoma nodular.

e)Melanoma que asienta en nevus congénito.

35.- La observación de imágenes de fibrosis intimal concéntrica(con aspecto en capas de cebolla) en las arterias interlobulillares renales constituye un hallazgo característico de :

a)Glomerulonefritis membrano-proliferativa.

b)Glomerulonefritis membranosa.

c)Glomerulonefritis postestreptococcica.

d)Riñón gotoso.

e)Hipertensión severa.

36.- La localización más común de carcinomas en varones de la 3ª edad es:

a)Esófago.

b)Estómago.

c)Intestino.

d)Próstata.

e)Pulmón.

37.- ¿Cuál de los siguientes aspectos anatomopatológicos tiene, individualmente, mayor valor pronóstico en el cáncer de mama?

a)Tamaño del tumor.

b)Grado histológico tumoral.

c)Marcadores oncofetales.

d)Infiltración de la piel y del pezón.

e)Afectación neoplásica de los ganglios axilares.

38.- ¿Cuál de las siguientes lesiones está en relación con el dietilestilbestrol?

a)Adenosis vaginal.

b)Anemia hemolítica.

c)Leucoencefalitis.

d)Shock.

e)Edema pulmonar.

39.- El liquen escleroso y atrófico de vulva debe ser considerado como:

a)Una neoplasia.

b)Una distrofia.

c)Un trastorno metabólico.

d)Una forma peculiar de trombosis.

e)Una forma peculiar de amiloidosis.

40.- Todos los cuadros siguientes menos uno se asocian con el hepatocarcinoma:

a)Producción de bilis.

b)Producción de alfa-fetoproteína.

c)Producción de mucinas.

d)Embolización pulmonar tumoral.

e)Hemorragia intraperitoneal.

41.- El carcinoma tiroideo originado en las llamadas células C intersticiales es el:

a)Escamoso

b)Indiferenciado

c)Folicular

d)Papilar.

e)Medular.

42.- En un paciente de menos de 40 años en el que encontramos una metástasis de un tumor en los ganglios laterales del cuello, hemos de pensar en un tumor primitivo tiroideo de tipo:

a)Folicular encapsulado.

b)Folicular no encapsulado.

c)Papilar.

d)Medular.

e)Indiferenciado.

43.- ¿Cuál de los siguientes tumores es más frecuente en el hueso primitivo tiroideo de tipo?

- a)Condroblastoma benigno.
- b)Condrosarcoma.
- c)Tumor de células gigantes.
- d)Carcinoma secundario.
- e)Osteosarcoma.

44.- El virus de Epstein-Barr se asocia con:

- a)Rinitis.
- b)Carcinoma bronquial.
- c)Linfoma de Burkitt.
- d)Fiebre por arañazo de gato.
- e)Gripe.

45.- Todos los factores que se citan menos uno predisponen comúnmente a las neumonías bacterianas:

- a)Infecciones virales del tracto respiratorio.
- b)Tabaquismo.
- c)Insuficiencia cardiaca congestiva.
- d)Infecciones bacterianas del tracto urinario.
- e)Anestesia general.

46.- La miocarditis infecciosa está habitualmente causada por todos los agentes que se citan menos uno:

- a)Virus coxsackie A.
- b)Tripanosoma. (Enfermedad de Chagas).
- c)Corinebacterium Difteriae.
- d)Estafilococo.
- e)Meningococo.

47.- La deficiencia en vitamina D se asocia con todos los cuadros siguientes excepto uno:

- a)Vegetarianismo estricto.
- b)Enfermedad celíaca.

c)Cirrosis.

d)Hipoparatiroidismo.

e)Fallo renal crónico.

48.- La célula xántica es:

a)Característica de la gota.

b)De Citoplasma claro por acúmulo de glucogeno.

c)Espumosa por presencia de vacuolas intracitoplásmicas con líquido.

d)Histiocito que almacena glóbulos de colesterol y otros lípidos en citopla.

e)Células con metamorfosis grasa.

49.- ¿Cuál de las siguientes condiciones no es una manifestación mayor de la fiebre reumática aguda?

a)Carditis.

b)Hepatoesplenomegalia.

c)Poliartritis.

d)Corea.

e)Eritema marginado.

50.- ¿Cuál de los siguientes tumores se asocia con más frecuencia con hipertensión?

a)Tumor de Krukenberg.

b)Carcinoma pulmonar de células en Grano de Avena.

c)Mixoma cardiaco.

d)Feocromocitoma.

e)Hemangiosarcoma.

51.- El llamado timoma granulomatoso es, en realidad, una:

a)Hiperplasia timica.

b)Tuberculosis timica.

c)Carcinoide timico.

d)Enfermedad de Hodgkin.

e)Timoma con miastenia gravis.

52.– Todos los cuadros siguientes menos uno producen de modo característico cambio graso en el hígado:

a)Síndrome de Reye.

b)Diabetes Mellitus.

c)Nutrición parenteral total.

d)Toxicidad por tetraciclinas.

e)Hepatitis viral aguda.

53.– En el nódulo de Aschoff, se encuentra un elemento celular fundamental, ¿cuál es?

a)Célula de Langhans.

b)Célula de Sternberg.

c)Célula de Touton.

d)Célula de Anitschkow.

e)Célula de Virchow.

54.– Los primeros depósitos de lípidos en la formación de una placa de ateroma, ocurren en:

a)Endotelio.

b)Tejido intersticial de la intima.

c)Tejido intersticial de la media.

d)Macrofagos.

e)Células musculares lisas de la intima.

55.– Esplenomegalia marcada se encuentra más frecuentemente en una de las siguientes leucemias. Señálela:

a)Linfoblastica aguda.

b)Monocitica aguda.

c)Mieloblastica aguda.

d)Mielomonocitica aguda.

e)Mieloide crónica.

56.– ¿Cuál de las siguientes localizaciones tumorales es menos frecuente en el sexo masculino en nuestro medio (provincia de Málaga)?

- a) Estómago.
- b) Sistema Hematopoyetico.
- c) Pulmón.
- d) Vejiga.
- e) Laringe.

57.- ¿Cuál de los siguientes cuadros histológicos de lesión hepatocelular es pronósticamente menos favorable?

- a) Formación de cuerpos de Councilman.
- b) Formación de infartos biliares.
- c) Formación de colágeno.
- d) Balonización hepatocitaria.
- e) Infiltrado inflamatorio lobular.

58.- Cuando un carcinoma de células transicionales de vejiga infiltra la capa muscular, se expresa como:

- a) Grado A.
- b) Grado B.
- c) Grado C.
- d) Grado D.
- e) Grado X.

59.- La cirrosis postnecrótica predispone a todos los cuadros siguientes menos uno:

- a) Hemorroides.
- b) Cálculos mixtos.
- c) Hiperaldosteronismo.
- d) Esplenomegalia.
- e) Hepatocarcinoma.

60.- Un herpes zoster usualmente:

- a) Causa viruela.
- b) Sigue la distribución de los nervios.

c)Causa una enfermedad fatal.

d)No afecta al hombre.

e)Causa una infección poco dolorosa.

61.– Todos los cuadros siguientes, menos uno, se asocian a menudo con la endocarditis bacteriana:

a)Abscesos pulmonares.

b)Esplenitis aguda.

c)Glomerulonefritis.

d)Hemorragias lineales en lecho ungueal.

e)Embolos cerebrales.

62.– Los cuadros malignos que ocurren más frecuentemente en niños menores de 5 años son todos los siguientes excepto uno:

a)Leucemia.

b)Tumor de Wilms.

c)Retinoblastoma.

d)Rabdomiosarcoma.

e)Osteosarcoma.

63.– ¿Cuál de los siguientes tipos de carcinomas broncopulmonares tiene un mayor tiempo de duplicación?

a)Escamoso bien diferenciado.

b)Escamoso pobremente diferenciado.

c)Indiferenciado.

d)De células en Grano de Avena.

e)Adenocarcinoma.

64.– ¿Cuál de los siguientes tipos de tiroiditis es probablemente de etiología vírica?

a)Tiroiditis aguda.

b)Tiroiditis subaguda.

c)Tiroiditis de Hashimoto.

d)Tiroiditis linfocitaria focal.

e)Tiroiditis de Riedel.

65.– En relación con la úlcera péptica NO es cierto que:

a)Hay frecuente incremento de células parietales en caso de úlcera duodenal.

b)Hemorragia masiva ocasional.

c)Raramente se maligniza.

d)Frecuentemente se maligniza.

e)Bordes nítidos y fondo limpio.

66.– Cuando un cirujano extirpa el apéndice con el diagnóstico de apendicitis, ¿cuál es el hallazgo anatomopatológico menos frecuente?

a)Infiltración aguda purulenta de todas las capas.

b)Un argentafinoma de la punta.

c)Una intususcepción.

d)No hay alteración aparente.

e)Infestación por oxiuros.

67.– ¿Cuál de las siguientes complicaciones es menos frecuente en la colitis ulcerosa?

a)Artritis.

b)Carcinoma de Colon.

c)Malnutrición.

d)Perforación.

e)Fístula vesico-cólica.

68.– El factor pronóstico más favorable en el cáncer colo-rectal es:

a)Ausencia de penetración en la pared muscular.

b)Mitosis por debajo del 1%.

c)No afectación linfoganglionar.

d)Secreción de antígeno carcinoembrionario.

e)Tumor cerca del extremo proximal cólico.

69.– ¿En qué parte del tubo digestivo es menos frecuente el carcinoma?

- a)Boca.
- b)Esófago.
- c)Estómago.
- d)Intestino delgado.
- e)Intestino grueso.

70.- La diferencia morfológica fundamental entre una hepatitis persistente y una hepatitis agresiva es que en la última se ve:

- a)Una infiltración linfocitaria portal.
- b)Formación de granulomas.
- c)Afectación de la lámina limitante.
- d)Mayor metamorfosis grasa.
- e)Colestasis intensa.

71.- La degeneración plumosa de hepatocito se observa más habitualmente en:

- a)Cirrosis alcohólica.
- b)Cirrosis Hemocromatosis.
- c)Porfiria hepatocutánea tardía.
- d)Hepatitis viral.
- e)Coolestasis extrahepática.

72.- En un alcohólico crónico, desnutrido, su esteatosis hepática puede lógicamente estar en relación con los siguientes factores, excepto uno:

- a)Lipólisis excesiva en tejido adiposo.
- b)Escaso aporte proteico.
- c)Lesión de organelas en hepatocitos.
- d)Hipoxia en hígado.
- e)Dificultad en la síntesis de lipoproteínas.

73.- El síndrome de Zollinger-Ellison, aparte de la demostración de las úlceras pépticas el patólogo puede demostrar:

- a)Tumores del sistema nervioso central y de la piel.

- b) Tumores del páncreas exocrino y bazo.
- c) Tumores del hígado y árbol biliar.
- d) Tumores del pulmón y pleura.
- e) Tumores del páncreas endocrino y de otras glándulas endocrinas.

74.- La única forma de hacer el diagnóstico de osteosarcoma es la demostración histológica de áreas:

- a) Cartilaginosas con osificación encondral.
- b) De tejido osteoide revestidas por células típicas.
- c) Fibrosarcomatosas con células gigantes.
- d) De tejido mixocondroide con células gigantes.
- e) De tejido osteoide revestidas por células atípicas.

75.- ¿Cuál es la causa menos probable de acúmulo excesivo de grasa en los hepatocitos?

- a) Envenenamiento por tetracloruro de carbono.
- b) Episodio de inanición en un sujeto obeso.
- c) En el embarazo normal.
- d) Anemia severa.
- e) Diabetes mellitus incontrolada.

76.- ¿Qué lesión produce el arañazo de gato?

- a) Absceso subyacente.
- b) Linfadenitis Cistoide en ganglios regionales.
- c) Granuloma en empalizada en el dermis de la vecindad.
- d) Necrosis caseosa en la hipodermis de la zona.
- e) Linfadenitis epitelioides necrotizante eosinófila.

77.- ¿Cuál de los siguientes aspectos es más constante y fidedigno para la identificación del origen epitelial en un tumor indiferenciado?

- a) Ausencia de mucina en el estroma.
- b) Abundante retículo endoplásmico rugoso.
- c) Adherencias por desmosomas entre células tumorales.

d)Producción de Queratina.

e)Secreción de mucina de tipo epitelial.

78.- ¿En cuál de los siguiente tumores no se ha demostrado relación evidente con factores genéticos o cromosómicos?

a)Leucemia Mieloide Crónica.

b)Carcinoma nasofaríngeo

c)Carcinoma medular de tiroides.

d)Poliposis colónica.

e)Retinoblastoma.

79.- Una lesión osteolítica situada en la epífisis de un hueso largo, de un hombre de 20 años, suele corresponder a:

a)Defecto fibroso.

b)Fibroma condromixoide.

c)Tumor de Ewing.

d)Tumor de células gigantes.

e)Fibrosarcoma.

80.- La diferencia fundamental entre congestión pasiva en infarto pulmonar, es:

a)El distinto tamaño de los septos.

b)La mayor o menor cantidad de eritrocitos extravasados.

c)La existencia de necrosis de los septos alveolares.

d)La coexistencia de colonias bacterianas.

e)La distinta localización.

81.- La pericarditis fibrinosa está producida particularmente por:

a)Fiebre Reumática.

b)Presencia de granulomas abscesificados.

c)Aparición de granulomas tuberculoides.

d)Presencia de Histiocitos.

e) Presencia de tejido de granulación.

82.- Los cistadenomas ováricos o los cistadenocarcinomas:

a) Siempre producen andrógeno.

b) Raramente son bilaterales.

c) Pueden ser papilares.

d) Generalmente ocurren durante el embarazo.

e) Son extremadamente raros.

83.- En un paciente con acromegalia, el tumor más frecuente es un:

a) Adenoma basófilo.

b) Craneofaringioma.

c) Adenoma acidófilo.

d) Teratoma.

e) Adenoma cromófobo.

84.- El hipertiroidismo secundario puede ser producido por:

a) Hipoplasia de Graves.

b) Hepatocarcinoma.

c) Tumores Trofoblásticos.

d) Alcohol.

e) Tiroiditis de Quervain.

85.- ¿Cuál de los siguientes tipos de carcinoma de tiroides tiene un comportamiento menos maligno?

a) Carcinoma papilar.

b) Carcinoma folicular.

c) Carcinoma anaplásico.

d) Carcinoma medular.

e) Carcinoma escamoso.

86.- ¿En cuál de los siguientes tipos de cirrosis es más factible el desarrollo de un hepatocarcinoma?

- a)Cirrosis alcohólica.
- b)Cirrosis biliar primaria.
- c)Cirrosis biliar secundaria.
- d)Cirrosis hemocromatósico.
- e)Cirrosis postnecrótico.

87.- La degeneración eosinófila (acidófila) del hepatocito es propia de :

- a)Hepatitis viral aguda.
- b)Hepatitis viral crónica.
- c)Hepatitis alcohólica.
- d)Hepatitis granulomatosa.
- e)De todas las anteriores.

88.- La degeneración plumosa del hepatocito se observa más habitualmente en:

- a)Cirrosis...portal (página 27 pregunta 59).
- b)Cirrosis hemocromatósica.
- c)Porfiria hepatocutánea tardia.
- d)Hepatitis viral.
- e)Colestasis extrahepática.

89.- La inflamación transmural de la pared intestinal con formación de granulomas no caseificantes y nódulos linfoides, es más típica de:

- a)Enteritis Regional (Enfermedad de cro...).
- b)Colitis ulcerosa.
- c)Sarcoidosis.
- d)Esclerosis sistémica.
- e)Adenocarcinoma.

90.- Las lesiones de los glomérulos renales que se observan en casos de diabetes se deben a un aumento de las células:

- a)Endoteliales capilares.

- b)Epiteliales capilares.
- c)Epiteliales capsulares.
- d)Mesangiales y de la matriz.
- e)Del aparato yuxtaglomerular.

91.- La presencia de tejido pancreático en la pared gástrica o duodenal se llama:

- a)Metaplasia.
- b)Hamartoma.
- c)Coristoma.
- d)Hipoplasia.
- e)Mielolipoma.

92.- Los antígenos tumorales específicos (AT) se cree que están situados en:

- a)El núcleo.
- b)Dentro de las membranas celulares.
- c)En las organelas citoplásmicas.
- d)En los ribosomas.
- e)En la membrana nuclear.

93.- El tumor maligno de partes blandas más frecuente de la vida adulta es el:

- a)Mesénquima maligno.
- b)Liposarcoma.
- c)Leiomiomasarcoma.
- d)Fibrosarcoma.
- e)Mesotelioma.

94.- ¿Cuál de los siguientes tumores reproduce con más frecuencia un cuadro paraneoplásico?

- a)Adenocarcinoma de recto.
- b)Carcinoma de células en Grano de Avena.
- c)Osteosarcoma.

d)Carcinoma ductal, infiltrante de mama.

e)Carcinoma gástrico superficial.

95.- ¿Cuál de los siguientes procesos da lugar comúnmente a una esplenomegalia más severa?

a)Leucemia monocítica aguda.

b)Leucemia linfoide aguda.

c)Leucemia miloide crónica.

d)Leucemia linfoide crónica.

e)Leucemia histiocítica.

96.- La presencia de microcalcificaciones en el seno de un tumor intracerebral debe hacernos pensar en un:

a)Astrocitoma.

b)Oligodendroglioma.

c)Ependinoma.

d)Neuroblastoma.

e)Glioblastoma.

97.- Los parámetros que se valoran para indicar el pronóstico en la gradación TNM son:

a)Citológicos.

b)Histológicos.

c)Anatómicos.

d)Son ciertas A, B y C.

e)Son ciertas B y C.

98.- La bronquitis crónica se relaciona con:

a)Linfoepitelioma.

b)Asma Bronquial.

c)Cáncer de pulmón.

d)Carcinoma en Grano de Avena.

e)Enfisema centrolobulillar.

99.- Las células argirófilas se relacionan con:

- a)Linfoepitelioma.
- b)Asma bronquial.
- c)Cáncer de pulmón.
- d)Carcinoma en Grano de Avena.
- e)Enfisema centrolobulillar.

100.- La tendencia metástasis suprarrenal se relaciona con:

- a)Linfoepitelioma.
- b)Asma bronquial.
- c)Cáncer de pulmón.
- d)Carcinoma en Grano de Avena.
- e)Enfisema centrolobulillar.

101.- El engrosamiento de la membrana basal se relaciona con:

- a)Linfoepitelioma.
- b)Asma bronquial.
- c)Cáncer de pulmón.
- d)Carcinoma en Grano de Avena.
- e)Enfisema centrolobulillar.

102.- La formación de rosetas es típica de:

- a)Glioblastoma.
- b)Neurinoma.
- c)Neuroblastoma.
- d)Oligodendroglioma.
- e)Meningioma.

103.- El coriocarcinoma es un tumor muy maligno cuyos lugares de asiento más común con:

- a)Próstata.

- b)Utero.
- c)Testículo.
- d)A y B son ciertas.
- e)B y C son ciertas.

104.– El infarto de miocardio que se examina morfológicamente a los 2–3 días del episodio clínico:

- a)No presenta lesiones.
- b)Aparece amarillento con borde hiperémico.
- c)Presenta características bandas de contracción.
- d)Tiene la misma consistencia que el resto del miocardio.
- e)Presenta tejido de granulación.

105.– La pericarditis fibrinosa aparece fundamentalmente en:

- a)Infecciones víricas.
- b)Tuberculosis.
- c)Infecciones micóticas.
- d)Fiebre reumática.
- e)Infecciones bacterianas.

106.– Los tumores primitivos del corazón son:

- a)Frecuentes.
- b)Raros.
- c)Más raros que los secundarios (metastásicos).
- d)Más frecuentes que los tumores secundarios (metastásicos).
- e)B y C son correctas.

107.– Entre las complicaciones de la endocarditis bacteriana se encuentran todas las que se enumeran excepto una:

- a)Embolia sépticas.
- b)Glomerulonefritis.
- c)Pericarditis fibrinosa.

d)Erosión valvular.

e)Septicemia.

108.– Los aneurismas congénitos en mora generalmente afectan a:

a)Aorta torácica.

b)Aorta abdominal.

c)Arterias renales.

d)Arterias temporales.

e)Arterias cerebrales.

109.– ¿Cuál de las siguientes inflamaciones de las paredes vasculares presenta cierta relación con el hábito de fumar?

a)Arteritis de células gigantes.

b)Enfermedad de Takayasu.

c)Tromboangeitis obliterante.

d)Poliarteritis nodosa.

e)Ninguna de ellas.

110.– ¿Cuál de los siguientes procesos se piensa que juega un papel importante en el desarrollo del aneurisma aórtico disecante?

a)Arteriosclerosis.

b)Hipotensión.

c)Necrosis quística de la media.

d)Aortitis sífilítica.

e)Arteritis alérgica.

111.– La neumonía por virus (neumonitis) produce una inflamación preferente en:

a)Bronquios principales.

b)Alveolos.

c)Vasos.

d)Pleura.

e) Intersticio septal.

112.- La aparición de fibrosis en los septos alveolares acompañada de presencia de hematíes y macrófagos con hemosiderina en las luces alveolares es característica de:

a) Edema de pulmón.

b) Congestión aguda.

c) Estasis o congestión crónica.

d) Tumor maligno pulmonar.

e) Inflamación tuberculosa.

113.- Los infartos pulmonares poseen una peculiar morfología y patogenia debido a:

a) La sustancia embolígena.

b) Proximidad al corazón.

c) Presencia de movimientos respiratorios.

d) Circulación doble pulmonar.

e) Causa desconocida.

114.- Las miocardiopatías se caracterizan en general por:

a) Infartos isquémicos.

b) Infartos hemorrágicos,

c) Aumento global del tamaño del corazón.

d) Disturbios en la circulación coronaria.

e) Hipertensión pulmonar primaria.

115.- La lesión morfológica básica y patognómica de la fiebre reumática es el:

a) Coma.

b) Cuerpo de Aschoff.

c) Gránulo azufrado.

d) Nódulo cirsoideo.

e) Nódulo de ¿? (página 30 pregunta 44).

116.- Uno de estos tumores pulmonares es de localización periférica y está asociado frecuentemente a

cicatrices:

- a) Adenocarcinoma pulmonar.
- b) Carcinoma en Grano de Avena.
- c) Carcinoma epidermoide.
- d) Sarcoma.
- e) Mesotelioma.

117.- La endocarditis de Libmann-Sach aparece en el 50 % de:

- a) Panarteritis nodosa.
- b) Hemocromatosis.
- c) L.E.D.
- d) Polimiositis/dermatomiositis.
- e) Granulomatosis de Wegener.

118.- El material observado principalmente en los espacios alveolares afectados en la insuficiencia cardiaca izquierda aguda consiste en:

- a) Líquido acidófilo-proteináceo.
- b) Macrófagos cargados de lípidos.
- c) Leucocitos polimorfonucleares.
- d) Sangre.
- e) H...

119.- En la neumonía lobar, el exudado de polinucleares es peculiar del período de:

- a) Congestión.
- b) Hepatización gris.
- c) Hepatización roja.
- d) Resolución.
- e) Cicatrización.

120.- El agrandamiento de los espacios alveolares pulmonares con destrucción de paredes alveolares:

- a) Bronquitis crónica.

- b)Enfisema.
- c)Infarto pulmonar.
- d)Hipertensión pulmonar.
- e)Proteinosis alveolar.

121.- ¿Cuál de los siguientes procesos está relacionado con el asbesto?

- a)Timoma.
- b) ¿?
- c)Neurinoma.
- d)Hiperplasia tímica.
- e)Mesotelioma.

122.- ¿Con cuál de los siguientes organelas celulares están relacionados los fenómenos de autólisis?

- a)Centriolo.
- b)Lisosomas.
- c)Membrana nuclear.
- d)Aparato de Golgi.
- e)Retículo endoplásmico rugoso.

123.- La tumefacción turbia con acúmulo intracelular de:

- a)Agua y sodio.
- b)Lípidos complejos.
- c)Grasas neutras.
- d)Potasio.
- e)Es un artefacto de Ticien.

124.- La necrosis por coagulación se observa en:

- a)Coma sifilítico.
- b)Infarto isquémico.
- c)Degeneración hialina de Zenker.

d)Intoxicación por mercurio.

e)Todas las anteriores.

125.- ¿En cuál de las siguientes enfermedades metabólicas se afectan las neuronas del plexo mientérico y se puede hacer en diagnóstico por medio de la biopsia rectal?

a)Enfermedad de Pompe.

b)Enfermedad de Mcardle.

c)Enfermedad de Gaucher.

d)Leucodistrofia metacromática.

e)Enfermedad de Tay–Sachs.

126.- La llamada bronquitis de éstasis es:

a)Un fenómeno alérgico.

b)Una consecuencia de la doble circulación pulmonar.

c)Un fenómeno autoinmune en los pacientes con congestión.

d)Un proceso muy exudativo.

e)Característico del microembolismo pulmonar.

127.- El Trombo post–mortem se diferencia del trombo in vivo porque éste último:

a)Se produce en arterias.

b)Se produce en venas.

c)Está fuertemente adherido a la pared vascular.

d)Posee una mayor longitud.

e)Solamente se encuentra en cavidades cardiacas..

128.- Las denominadas líneas de Zhan se observan en los:

a)Trombos rojos.

b)Coágulos post–mortem.

c)Trombos mixtos.

d)Trombos hialinos.

e)Trombos de la microcirculación.

129.- Para hacer el diagnóstico morfológico de coagulación intravascular diseminada es preciso observar trombos:

- a) Mixtos.
- b) Rojos.
- c) De fibrina.
- d) De hematíes y fibrina.
- e) Ninguno de ellos.

130.- Los infartos secundarios a la oclusión de la luz arterial en el bazo son de tipo:

- a) Hemorrágicos.
- b) Anémicos.
- c) No hay infartos porque la circulación es doble.
- d) Afectan exclusivamente a la pulpa roja.
- e) Afectan exclusivamente a la pulpa blanca.

131.- ¿Cuál de las siguientes modificaciones es la que acontece en los primeros momentos de la inflamación aguda?

- a) Aumento de la permeabilidad vascular.
- b) Emigración de células mononucleadas.
- c) Proliferación de fibroblastos.
- d) Producción de inmunoglobulinas.
- e) Formación de células gigantes.

132.- La reacción inflamatoria constituida por una pared granulomatosa que rodea a un exudado de leucocitos polimorfonucleares en el que se encuentran Granos de azufre (aspecto macroscópico) caracteriza a:

- a) Tuberculosis.
- b) Sarcoidosis.
- c) Sífilis.
- d) Fiebre por arañazo de gato.
- e) Actinomicosis.

133.- La infiltración perivascular e intersticial por células mononucleadas es propia de infecciones por:

- a)Virus.
- b)Gram-positivos.
- c)Bacilo tuberculoso.
- d)Hongos.
- e)Gram negativos.

134.- ¿Cuál de los siguientes agentes tiene mayor importancia con causa determinante de malformación congénita?

- a)Gonococia.
- b)Sífilis.
- c)Traumatismos.
- d)Hemorragia durante el embarazo.
- e)Radiaciones ionizantes.

135.- ¿Cuál de los tumores que se citan a continuación se localiza principalmente en el cerebelo?

- a)Glioblastoma multiforme.
- b)Ependimoma.
- c)Oligoendroglioma.
- d)Meduloblastoma.
- e)Astrocitoma fibroso.

136.- ¿Cuál de los siguientes caracteres diferencia al carcinoma in situ del carcinoma infiltrante?

- a)Número de mitosis.
- b)Integridad de la membrana basal.
- c)Anaplasia celular.
- d)Necrosis.
- e)Hemorragia.

137.- Las metástasis óseas son más frecuentes en:

- a)Carcinoma de próstata.
- b)Carcinoma gástrico.

c)Osteosarcoma.

d)Hepatocarcinoma.

e)Melanoma.

138.– Los llamados tumores mixtos son más frecuentes en:

a)Tiroides.

b)Paratiroides.

c)Paretida.

d)Páncreas.

e)Hipófisis.

139.– ¿Cuál de los siguientes tumores es el más frecuente en el corazón?

a)Metastásicos.

b)Rabdomioma.

c)Mixoma.

d)Neurinoma.

e)Lipoma.

140.– ¿Dentro de la cavidad torácica los tumores neurogénicos se localizan preferentemente en?

a)Mediastino superior.

b)Mediastino posterior.

c)Mediastino anterior.

d)Mediastino inferior.

e)Indistintamente en cualquiera de las regiones anteriores.

141.– De los siguientes tumores pulmonares, ¿cuál es el que está relacionado con la exposición continuada a asbestos?

a)Carcinoma Broncogénico.

b)Adenocarcinoma pulmonar.

c)Carcinoide.

d)Mesotelioma.

e)Paraganglioma pulmonar.

142.- ¿Cuál de las siguientes causas produce hipertrofia ventricular izquierda asimétrica?

a)Estenosis aórtica.

b)Insuficiencia aórtica.

c)Estenosis mitral.

d)Insuficiencia mitral.

e)Miocardiopatía obstructiva hipertrófica.

143.- El infarto de miocardio ocurre más frecuentemente en el:

a)Septo interventricular.

b)Pared anterolateral derecha.

c)Ventrículo izquierdo.

d)Ventrículo derecho posterior.

e)Las respuestas A y C son correctas.

144.- ¿Cuál de los siguientes tipos de pericarditis a menudo conduce a pericarditis fibrosante constrictiva?

a)Estafilococcica.

b)Reumática.

c)Urémica.

d)Lípica.

e)Micética.

145.- Una arteritis necrotizante afectando a las pequeñas arterias musculares es más propia de:

a)Miastenia gravis.

b)Panarteritis nodosa.

c)Arterioesclerosis.

d)Aneurisma disecante.

e)Sífilis.

146.- Constituyen ejemplos de neumonía intersticiales descamativas todas las siguientes, excepto:

- a)Neumonía por bleomicina.
- b)Pulmón del granjero.
- c)Beriliosis aguda.
- d)Neumonía Neumococcica.
- e)Neumonía atípica por aceite de colza contaminado.

147.- ¿Con cuál de la siguiente patología pulmonar se asocia frecuentemente el déficit dealfa-1-antitripsina?

- a)Enfisema.
- b)Atelectasia.
- c)Asma bronquial.
- d)Bronquiectasias.
- e)Carcinoma.

148.- ¿Cuál de estos tumores malignos es más frecuente en el esófago?

- a)Carcinoma epidermoide.
- b)Adenocarcinoma.
- c)Neuroblastoma.
- d)Carcinoide.
- e)Liposarcoma.

149.- ¿Cuál de los siguientes signos morfológicos es más propio de la hepatitis crónica agresiva?

- a)Necrosis hepatocitaria periportal erosiva.
- b)Necrosis hepatocitaria centro-lobulillar.
- c>Infiltrado inflamatorio crónico con eosinófilos.
- d>Infiltrado inflamatorio agudo y múltiple.
- e)Degeneración acidéfila del hepatocito.

150.- El tumor maligno que se asocia más frecuentemente con cirrosis es:

- a)Hepatoblastoma.
- b)Colangiocarcionoma.

c)Adenoma células hepáticas.

d)Angiosarcoma.

e)Hepatocarcinoma.

151.– La degeneración eosinófila (Acidófila) del hepatocito es propia de:

a)Hepatitis viral aguda.

b)Hepatitis viral crónica.

c)Hepatitis alcohólica.

d)Hepatitis granulomatosa.

e)De todas las anteriores.

152.– La limitis plástica es:

a)Un tipo especial de tumor conjuntivo.

b)Una inflamación de la lengua.

c)Un carcinoma gástrico.

d)Un granuloma de cuerpo extraño.

e)Una forma de melanoma.

153.– La inflamación transmural de la pared intestinal con formación de granulomas no casificantes y nódulos linfoides es más típico de:

a)Enfermedad de Crohn.

b)Colitis ulcerosa.

c)Sarcoidosis.

d)Esclerosis sistémica.

e)Adenocarcinoma.

154.– La fracción C3 del complemento suele estar persistentemente baja en:

a)Glomerulonefritis extramembranosa.

b)Glomeruloesclerosis (Hialinosis) segmentaria y focal.

c)Pielonefritis.

d)Glomerulonefritis membranoproliferativa.

e)Glomerulonefritis proliferativa mesangial (Endocapilar).

155.– La lesión objetivable en el síndrome nefrítico con cambios mínimos es:

a)Proliferación endocapilar.

b)Engrosamiento de la membrana basal.

c)Depósitos capilares.

d)Fusión pedicelar.

e)Formación de semilunas epiteliales.

156.– La distorsión arquitectural pelo–calicial es propia de:

a)Pielonefritis aguda.

b)Nefroangioesclerosis.

c)Pielonefritis crónica.

d)Glomerulonefritis extramembranosa.

e)Glomerulonefritis lípica.

157.– En un paciente con acromegalia el tumor hipofisiario más frecuente es un:

a)Adenoma basófilo.

b)Cranfaringioma.

c)Adenoma acidéfilo.

d)Teratoma.

e)Adenoma cromóforo.

158.– ¿Cuál de los siguientes procesos que afectan a la trompa es responsable en mayor medida de esterilidad?

a)Salpingitis aguda.

b)Salpingitis tuberculosa.

c)Endometriosis.

d)Endosalpingiosis.

e)Tumor intratubárico.

159.– La endometriosis:

- a) Es una lesión maligna.
- b) Afecta sólo al útero.
- c) Puede afectar a los ovarios.
- d) Permanece sin modificaciones durante el ciclo menstrual.
- e) Es un proceso muy raro.

160.- ¿Sobre cuáles de los siguientes procesos es más frecuente el desarrollo de un carcinoma?

- a) Poliposis colónica.
- b) Melanosis colónica.
- c) Pólipo hiperplásico.
- d) Pólipo hamartomatoso.
- e) Pólipos en el síndrome de Peutz-Jeghers.

161.- La incidencia de cáncer invasor de cuello uterino:

- a) Está disminuyendo.
- b) Se mantiene estacionaria desde hace décadas.
- c) Está aumentando.
- d) Se incrementa conforme aumenta la expectativa de vida.
- e) Está en íntima relación con la utilización estrógenos.

162.- En las campañas de diagnóstico precoz del cáncer cervical uterino juega un papel primordial:

- a) Histerografía.
- b) Citología exfoliativa.
- c) Biopsia aislada.
- d) Biopsia secuencial repetida.
- e) Determinación de niveles séricos de antígeno carcinoembrionario.

163.- La invasión neoplásica múltiple de los vasos linfáticos dérmicos en la mama es propia del:

- a) Carcinoma lobulillar.
- b) Carcinoma tubular.

c)Carcinoma inflamatorio.

d)Carcinoma medular.

e)Carcinoma coloide.

164.– El criterio más fiable para el diagnóstico de malignidad de los tumores tiroideos es:

a)Cambio oxifálico en las células neoplásicas.

b)Presencia de Mitosis.

c)Polimorfismo celular.

d)Presencia de necrosis y hemorragia.

e)Invasión vascular y/o capsular.

165.– En la desmielinización segmentaria hay:

a)Lesión de células de Schwann.

b)Lesión axonal primaria.

c)Degeneración Walleriana.

d)Hipertrofia concéntrica En bulbo de Cebolla de células de Schwann.

e)Lesión de la placa motora.

166.– El carcinoma de páncreas se localiza principalmente en:

a)Cabeza.

b)Cuerpo.

c)Cola.

d)Indistintamente en cualquier zona.

e)Es exclusivo del cuerpo.

167.– Los grados de infiltración de Dukes se han mostrado particularmente útiles para determinar el pronóstico en el cáncer:

a)Vesical.

b)Gástrico.

c)Colorrectal.

d)Endometrial.

e)Pulmonar.

168.– El adenocantoma es una variedad tumoral:

a)Más frecuente en endometrio.

b)Más frecuente en mama.

c)Más frecuente en ovario.

d)Que tiene peor pronóstico.

e)Que incide especialmente en jóvenes.

169.– No es raro encontrar seminomas in situ en:

a)Orquitis granulomatosa.

b)Orquitis tuberculosa.

c)Testículos criptorquídicos.

d)Hidrocele testicular.

e)Testículo senil.

170.– ¿En cuál de los siguientes tumores se ha detectado la presencia de receptores hormonales teniendo gran valor en la orientación terapéutica de los mismos?

a)Cáncer de próstata.

b)Cáncer de mama.

c)Cáncer de endometrio.

d)Son ciertas A y B.

e)Son ciertas A, B y C.

171.– ¿Cuál de los siguientes factores tiene mayor importancia etiológica en el cáncer de endometrio?

a)Obesidad.

b)Diabete.

c)Hipertensión.

d)Tumores ováricos feminizantes.

e)Anticonceptivos orales no-secuenciales.

172.– ¿Cuál de los siguientes tipos anatomopatológicos de carcinoma de mama es más frecuente?

a)Medular.

b)Coloide.

c)Tubular.

d)Apocrino.

e)Escirro.

173.- ¿Cuál de los siguientes tipos de carcinoma mamario tiene mejor pronóstico?

a)Papilar.

b)Escirro.

c)Lobulillar infiltrante.

d)Apocrino.

e)Ductal infiltrante sin otras especificaciones.

174.- La afectación neoplásica de los ganglios supraclavivulares debe considerarse en el carcinoma de mama como:

a)Afectación locoregional

b)Diseminación a ganglios regionales (igual que axilares).

c)Enfermedad diseminada.

d)Signo de mejor pronóstico que la metástasis osea aislada.

e)Propia del sarcoma filodes mamario.

175.- ¿A qué edad se observa más frecuentemente el fibroadenoma de mama?

a)Infancia.

b)Adolescentes.

c)Adultos jóvenes.

d)Adultos maduros.

e)Ancianos.

176.- La presencia de una lesión eczematoide en la región de la areola mamaria sin coexistir masa palpable sugiere:

a)Mastitis traumática.

b) Mastopatía fibroquística.

c) Enfermedad de Paget.

d) Carcinoma inflamatorio.

e) Linfoma mamario.

177.- ¿Cuál de las siguientes hipótesis es más verosímil para justificar la diferencia de incidencia en las trombosis venosas de miembros superiores e inferiores?

a) Revestimiento endotelial por sustancias antiagregantes y/o fibrinolíticos.

b) Acción de la gravedad.

c) Flujo sanguíneo.

d) Diferencias en la estructura parietal de los vasos.

e) Actividad funcional diferencial.

178.- ¿En cuál de los siguientes órganos la amiloidosis secundaria tiene efectos más desfavorables?

a) Hígado.

b) Bazo.

c) Riñón.

d) Ganglio linfático.

e) Testículo.

179.- ¿Cuál de entre los tumores que se indican tiene un comportamiento biológico muy agresivo?

a) Heurinoma.

b) Basalioma.

c) Cilondroma.

d) Glioblastoma.

e) Histiocitoma.

180.- Un tipo peculiar de degeneración hialina a nivel de los hepatocitos (sustancia hialina de Mallory) se observa especialmente en:

a) Hepatocarcinoma.

b) Hepatitis alcohólica.

c) Colestasia Intrahepática.

d) Colestasia extrahepática.

e) Hapatocolangiomas.

181.– La formación de rosetas es típica de:

a) Glioblastoma.

b) Neurinoma.

c) Neuroblastoma.

d) Oligodendroglioma.

e) Meningioma.

182.– Una de las siguientes modificaciones es indicativa de lesión celular irreversible:

a) Fagolisosoma.

b) Aumento de retículo endoplásmico liso.

c) Dispersión de polirribosomas.

d) Edema mitocondrial.

e) Cariorrexia.

183.– El tejido de granulación está formado por:

a) Capilares, fibroblastos y elementos inflamatorios.

b) Capilares, células epiteliales y melanina.

c) Arteriolas, músculo liso y células inflamatorias.

d) Epidermis, fibroblastos y elementos inflamatorios.

e) Ninguna de las anteriores.

184.– ¿Cuál de los siguientes procesos se complica frecuentemente con una amiloidosis secundaria?

a) Neumonía.

b) Artritis reumatoide.

c) Tifoidea.

d) Pancreatitis aguda.

e) Infarto de miocardio.

185. – Un émbolo puede no dar sintomatología si está enclavado en:

a) Arteria renal.

b) Polígono de Willis.

c) Arteria pulmonar.

d) Arterias coronarias.

e) Todas ellas.

186. – Si en un territorio tisular aparece cierta desorganización y dislocación de sus elementos constituyentes, sin atípicas hablaremos de:

a) Metaplasia.

b) Anaplasia.

c) Displasia.

d) Distrofia.

e) Hipotrofia.

187. – La degeneración plumosa del hepatocito se observa fundamentalmente en:

a) Porfiria hepatocutánea tardía.

b) Cirrosis hemocromatósica.

c) Hepatitis viral.

d) Colestasis extrahepática.

e) Cirrosis portal.

188. – El sarcoma botrioides se origina en:

a) Fibroblastos.

b) Células nerviosas.

c) Células óseas.

d) Cartilaginosas.

e) Musculares.

189. – En la hepatitis aguda tipo B (sérica), podemos demostrar:

a)Fibrosis marcada.

b)Cuerpos de Councilman.

c)Antígenos Australia.

d)A y B son correctas.

e)B y C son correctas.

190.- ¿Cuál de estas formas de enfermedad de Hodgkin tiene peor pronóstico?

a)Esclerosis nodular.

b)Predominio linfocítico.

c)Deplección linfocítica.

d)Celularidad mixta.

e)Todas tienen igual pronóstico.

191.- El infarto de miocardio ocurre más frecuentemente en:

a)Septo interventricular.

b)Ventrículo derecho posterior.

c)Ventrículo izquierdo.

d)A y B son correctas.

e)A y C son correctas.

192.- Las placas de aterosclerosis se localizan fundamentalmente:

a)Dentro de la intima.

b)¿?

c)¿?

d)¿?

e)¿?

193.- El cambio más común de los islotes de Langerhans en la Diabetes Mellitus del adulto es la:

a)Hiperplasia.

b)Inflamación.

c)Hialinización.

d)Fibrosis.

e)Necrosis.

194.– Cuando hablamos de Presencia de bacterias en el torrente sanguíneo sin manifestaciones clínicas, nos referimos a:

a)Sapremia.

b)Bacteriemia.

c)Septicemia.

d)Toxemia.

e)Todas las anteriores.

195.– En el diagnóstico precoz de cáncer colo–rectal, para la población general, se utiliza:

a)Test de Guayaco.

b)Colonoscopia.

c)Biopsia rectal

d)Enema opaco.

e)Punción/Aspiración.

196.– Referido a los tumores pulmonares, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?

a)El carcinoma sobre cicatriz suele ser adenocarcinoma.

b)Las metástasis son más frecuentes en cerebro y suprarrenal.

c)Los adenomas bronquiales rara vez malignizan.

d)El más frecuente es el carcinoma en Grano de Avena.

e)No es rara la asociación con cuadros paraneoplásicos.

197.– ¿Cuál de los siguientes tipos tumorales ováricos no debe ser considerado como de origen germinal?

a)Tumores de células de la granulosa.

b)Cortocarcinoma.

c)Carcinoma embrionario.

d)Teratoma quístico (quiste dermoide).

e) Tumor de seno endodérmico.

198.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las llamadas bandas de contracción en el miocardio No es correcta?

a) Aparecen antes del primer día de isquemia miocárdica oclusiva.

b) Aparecen después del primer día de isquemia miocárdica oclusiva.

c) Están constituidas por microfilamentos.

d) Suelen coexistir con depósitos densos intramitocondriales.

e) Suelen coexistir con rupturas de la membrana celular.

199.- La presencia en la epidermis de células aisladas con morfología redondeada y acidofilia citoplásmica por queratinización se conoce con el nombre de:

a) Acantolisis.

b) Paraqueratosis.

c) Acantosis.

d) Hiperqueratosis.

e) Disqueratosis.

200.- Una complicación frecuente en parotiditis (paperas) que acontece en la juventud es:

a) Uveítis.

b) Miocarditis.

c) Orquitis.

d) Pancreatitis hemorrágica.

e) Encefalitis esclerosante.

201.- La posible evolución de un trombo incluye:

a) Lisis, organización, desprendimiento y/o malignización.

b) Lisis, recanalización, organización y/o desprendimiento.

c) Recanalización, epitelización, organización y/o desprendimiento.

d) Endotelización, recanalización, lisis y/o arterización.

e) Organización, desprendimiento malignización y/o lisis.

202.- La acantosis nígricans es un proceso cutáneo que, en algunos casos y sobre todo, constituye una lesión paraneoplásica del:

- a)Carcinoma gástrico.
- b)Cáncer esofágico.
- c)Leiomioblastoma.
- d)Adenocarcinoma endometrial.
- e)Sarcomas de partes blandas.

203.- Una de las repuestas siguientes No es propia del cuadro morfológico del asma:

- a)Metaplasia pavimentosa focal.
- b)Engrosamiento de la membrana basal.
- c)Hipertrofia de la muscular.
- d)Hipertrofia glandular mucosa.
- e)Infiltrado de eosinófilos.

204.- Todas las respuestas siguientes menos una, corresponden a factores de riesgo en la colitis ulcerosa:

- a)Enfermedad de más de diez años de evolución.
- b)Sintomatología continua, no intermitente.
- c)Afectación de la totalidad del colon.
- d)Hemorragia oculta en heces.
- e)Edad de comienzo 25 años.

205.- El tumor de hueso que más frecuentemente se asocia a ala enfermedad de Paget es:

- a)Condrosarcoma.
- b)Condroblastoma.
- c)Osteosarcoma.
- d)Osteoblastoma.
- e)Tumor de células gigantes del hueso.

206.- ¿Cuál de los siguientes tipos histológicos de carcinoma de pulmón tiene un tiempo de duplicación más corto?

- a)Escamoso.
- b)Adenocarcinoma.
- c)Bronquiolo–alveolar.
- d)Indiferenciado de células grandes.
- e)Microcítico (en Grano de Avena).

207.– De entre los numerosos procesos que cursan con malabsorción hay algunos en los que la biopsia intestinal puede mostrar lesiones diagnósticas, ¿en cuál de las siguientes enfermedades No son específicas?

- a)Enfermedad de Whipple.
- b)Enfermedad celiaca.
- c)Agammaglobulinemia.
- d)Linfagiectasia intestinal.
- e)Amiliodosis.

208.– La úlcera aguda gástrica presenta todos los caracteres morfológicos que se enumeran menos uno:

- a)Lesiones únicas.
- b)Menores de 1 cm. de diámetro.
- c)Afectan sólo a la mucosa.
- d)Base de la úlcera de coloración oscura.
- e)Bordes poco netos.

209.– El diagnóstico citológico mediante punción/aspiración está más indicado en uno de los siguientes tipos tumorales pulmonares:

- a)Carcinoma epidermoide.
- b)Carcinoide bronquial.
- c)Carcinoma en Grano de Avena.
- d)Adenocarcinoma.
- e)Tumor mucoepidermoide.

210.– El cáncer de esófago se localiza preferentemente en:

- a)Tercio superior.

- b)Tercio medio.
- c)Tercio inferior.
- d)Cualquier localización esofágica.
- e)Distinto tramo según tipo histológico.

211.- ¿Cuál de las siguientes anomalías cardíacas No se incluyen en la tetralogía de Fallot?

- a)Estenosis aórtica.
- b)Estenosis pulmonar.
- c)Hipertrofia ventricular.
- d)Defecto septal interventricular.
- e)Dextroposición de la aorta.

212.- ¿Cuál de los siguientes parámetros del tumor tiene mayor correlación con el pronóstico, en el cáncer de mama?

- a)Multicentricidad.
- b)Tamaño.
- c)Localización intramamaria.
- d)Receptores estrogénicos.
- e)Densidad del infiltrado linfoide.

213.- De un modo global, ¿cuál de los siguientes factores etiológicos upone menos riesgo en la producción de cánceres humanos?

- a)Congénitos.
- b)Sol.
- c)Dieta.
- d)Tabaco.
- e)Radiaciones ionizantes.

214.- El melanoma medular se caracteriza por presentar un componente epidérmico lateral de:

- a)Léngito maligno.
- b)Léntigo simple.

- c)Melanoma pagetoide.
- d)No presenta ningún componente.
- e)Presenta todo tipo de componente.

215.– La diferencia entre el nódulo y el complejo de Ghon, consiste:

- a)En el segundo hay afectación ganglionar.
- b)El primero es tuberculosis primaria y el segundo secundaria.
- c)El primero se localiza en vértice y el segundo en bases.
- d)En el primero no existe ¿?
- e)El segundo exige diseminación broncógena y hematógena.

216.– ¿Cuál de las siguientes enfermedades tiroideas No tiene implicación con mecanismos autoinmunes?

- a)Tiroiditis granulomatosa de Quervain.
- b)Tiroiditis de Hashimoto.
- c)Hiperplasia difusa primaria.
- d)Enfermedad de graves.
- e)Mixedema primario.

217.– Los microaneurismas de tipo hipertensivo pueden originar en sistema nervioso central todas las complicaciones que se enumeran menos una:

- a)Hemorragia intraparenquimatosa.
- b)Hemorragia a partir de las preforantes de la arteria cerebral media.
- c)Hemorragia subcanoidea no traumática.
- d)Hemorragia hemisférica con destrucción de núcleos grises centrales.
- e)Ruptura de vasos arteriales de un calibre entre 50 y 200 milimicras D.

218.– ¿Cuál de los siguientes tumores es más frecuente en el mediastino posterior?

- a)Timoma.
- b)Linfoma no-Hodgkin.
- c)Enfermedad de Hodgkin.
- d)Tumor del seno endodérmico.

e)Ganglioneuroma.

219.– Se ha demostrado que la aparición de adenosis vaginal está relacionada con el consumo por la madre de:

a)Talidomida.

b)Aspirina.

c)Progesterona.

d)Piperazina.

e)Dietilestilbestrol.

220.– La célula más abundante en las lesiones de la sífilis en el período primario como en el secundario es:

a)Células de Langhans.

b)Célula epitelioides.

c)Linfocito.

d)Célula plasmática.

e)Histiocito.

221.– ¿Cuál de los siguientes procesos conduce con mayor frecuencia a obstrucción tubárica y embarazo ectópico?

a)Salpingitis gonocócica.

b)Salpingitis tuberculosa.

c)Salpingitis por cuerpo extraño (salpingografías).

d)Salpingitis istmico nodosa.

e)Endosalpingiosis.

222.– La micosis fungoide es:

a)Una infección micética cutánea.

b)Una infección por micoplasmas.

c)Una afectación pulmonar por hongos.

d)Un tipo de linfoma de células.

e)Un tipo de linfoma de células T.

223.- En el cáncer colo-rectal el dato morfológico de más valor pronóstico es:

- a)Grado histológico.
- b)Grado de penetración de la pared.
- c)Tipo histológico.
- d)Diámetro tumoral.
- e)Infección secundaria.

224.- ¿Cuál de los siguientes tumores tiene peor pronóstico en el cérvix uterino?

- a)Carcinoma verrugoso.
- b)Carcinoma queratinizante de células grandes.
- c)Carcinoma queratinizante.
- d)Carcinoma de células pequeñas.
- e)Carcinoma microinvasor con imágenes de invasión linfática.

225.- En los estudios generales realizados tras autopsias clínicas, las placas de ateroma son más manifiestas en:

- a)Aorta ascendente.
- b)Arterias carótidas (comunes).
- c)Aorta abdominal (mitad inferior).
- d)Arteria pulmonar.
- e)Arteria retinianas.

226.- Las células lacunares suelen ser casi exclusivas de una de las variantes de la enfermedad de Hodgkin:

- a)Deplección linfocítica tipo reticular.
- b)Deplacción linfocítica tipo fibroso.
- c)Predominio linfocítico.
- d)Celularidad mixta.
- e)Esclerosis nodular.

227.- ¿Cuál de los siguientes hallazgos morfológicos es más característico de la reticulosis medular histiocitaria?

- a)Afectación ósea multifocal.
- b)Eritrofagocitosis.
- c)Presencia de Histiocitos atípicos.
- d)Infiltración celular polimorfa.
- e)Afectación de médula ósea.

228.- ¿En cuál de los siguientes tipos de trombosis no participa la lesión endotelial?

- a)Trombosis venosa.
- b)Trombosis arteriales.
- c)Trombosis de la microcirculación.
- d)Trombosis cardíacas auriculares.
- e)Trombosis cardíacas ventriculares.

229.- ¿En qué momento después de iniciarse un infarto de miocardio existen más posibilidades de que se produzca una ruptura de pared cardíaca?

- a)Durante el primer día.
- b)Durante los dos primeros días.
- c)Entre el segundo y cuarto día.
- d)Entre el quinto y décimo día.
- e)Después del décimo día.

230.- ¿Cuál de los siguientes tumores produce hipertensión arterial?

- a)Adenoma oxifílico.
- b)Insulinoma.
- c)Feocromocitoma.
- d)Angiosarcoma.
- e)Sarcoma de Kaposi.

231.- ¿En cuál de las siguientes ramas coronarias suele ser más importante la arteriosclerosis y la presencia de trombosis?

- a)Circunfleja izquierda.

- b) Circunfleja derecha.
- c) Descendente anterior.
- d) Descendente posterior.
- e) Primer bifurcación de coronaria derecha.

232. – En la secuencia de acontecimientos que ocurren tras la lesión de una pequeña arteria, ¿cuál aparece en cuarto lugar?

- a) Depósito de fibrina.
- b) Organización.
- c) Depósito de plaquetas.
- d) Recanalización.
- e) Vasoconstricción.

233. – Son factores predisponentes a las glomerulonefritis todos los siguientes menos uno:

- a) Respuesta pobre de anticuerpos.
- b) Aporte continuo de antígeno.
- c) Sistema anormal del complemento.
- d) Reacción antígeno-anticuerpo con exceso de anticuerpo.
- e) Depuración insuficiente del sistema mononuclear fagocítico.

234. – ¿En cuál de los siguientes tumores es más frecuente la producción de una sustancia semejante a la insulina (hipoglucemiante)?

- a) Dermatofibrosarcoma Protuberans.
- b) Fibrosarcoma peritoneal.
- c) Melanoma pagetoide.
- d) Neuroblastoma.
- e) Carcinoma embrionario.

235. – Indica cuál es el tumor en el que la correspondencia entre grado histológico y comportamiento biológico es menos previsible:

- a) Neuroblastoma.
- b) Glioblastoma.

c)Ependinoma.

d)Oligodendroglioma.

e)Meningioma.

236.– El hematocele es:

a)Hemorragia intrarubárica.

b)Hemorragia en la cavidad peritoneal.

c)Hemorragia articular.

d)Hemorragia en la vaginal del testículo.

e)Hemorragia en los centros nerviosos.

237.– Las embolias procedentes de los plexos y periprostático pueden originar infarto:

a)Pulmonar.

b)Miocárdico.

c)Renal.

d)Cerebral.

e)Esplénico.

238.– En el infarto se produce:

a)Necrosis gaseosa.

b)Necrosis por coagulación.

c)Necrosis fibrinoide.

d)Necrosis enzimatica.

e)No hay necrosis.

239.– La necrosis enzimática de la grasa es característica de:

a)Embolia grasa.

b)Pancreatitis aguda hemorrágica.

c)Paritonitis tuberculosa.

d)Gangrena gaseosa.

e)Hiperamilasemia.

240.– Los factores fundamentales que favorecen la trombosis son todos los siguientes menos uno. Cítelo:

a)Estasis vascular.

b)Alteración de la integridad del endotelio.

c)Alteración del PH sanguíneo.

d)Alteración de la composición sanguínea.

e)Interrupción del flujo laminar.

241.– Si utilizamos una reacción para buscar la presencia de hierro en un tejido sabemos que allí hay:

a)Bilirrubina.

b)Hematina.

c)Hematoidina.

d)Hemosiderina.

e)Pigmento antracotico.

242.– Una de estas formas de leucemia ocasiona numerosas lesiones óseas destructivas, las cuales caracterizan el cuadro radiológico:

a)Mieloide aguda.

b)Mieloide crónica.

c)De células plasmáticas.

d)monocitica aguda.

e)Megacariocitica.

243.– Cita aquel proceso que tiene que ver con el desarrollo de un aneurisma disecante:

a)Arteritis alérgica.

b)Sífilis.

c)Arterioesclerosis.

d)Necrosis quística de la media.

e)Tabaquismo.

244.– La metaplasia se observa con más frecuencia en:

a)Hueso y cartílago.

b)Piel (Epidermis).

c)Epitelio respiratorio.

d)Tejidos mesenquimales.

e)Grasa.

245.– La hipertrofia e hiperplasia aparece con más frecuencia en:

a)Utero y anejos.

b)Corazón y vasos.

c)Bronquios y bronquiolos.

d)Músculo esquelético.

e)Sistema nervioso central y periférico.

246.– La hiperplasia glandular quística de endometrio es más frecuente en:

a)Mujeres perimenopáusicas.

b)Niñas de 2 a 10 años.

c)Pubertad.

d)Mujeres postmenopáusicas.

e)Entre los 20–35 años.

247.– El carcinoma de endometrio es:

a)Más frecuente que el de cérvix.

b)Menos frecuente que el de cérvix.

c)Frecuencia similar al de cérvix.

d)Más frecuente en jóvenes, y el de cérvix predomina en postmenopáusicas.

e)Ambos son muy raros.

248.– Los linfomas de tubo digestivo se localizan con más frecuencia en:

a)Sigmoide.

b)Apéndice.

c)Intestino delgado.

d)Colon ascendente.

e)En cualquier nivel.

249.- El tipo tumoral más frecuente en vulva es:

a)Melanoma.

b)Carcinoma escamoso.

c)Leiomiomasarcoma.

d)Basalioma.

e)Ninguno de los anteriores.

250.- Señala cuál de entre los tumores que se citan tiene mejor pronóstico:

a)Melanoma.

b)Hepatoma.

c)Basalioma.

d)Glioma.

e)Hipernefroma.

251.- El síndrome hemolítico-urénico aparece fundamentalmente en:

a)Adultos.

b)Cancerosos.

c)Niños.

d)Diabéticos.

e)Cualquier edad.

252.- La presencia de microcalcificaciones en el seno de un tumor intracerebral debe hacernos pensar en un:

a)Astrocitoma.

b)Oligodendroglioma.

c)Ependimoma.

d)Neuroblastoma.

e)Glioblastoma.

253.– De células último-bronquiales, pertenecientes al sistema Apud de Pearse, se originan los:

a)Gonadocarcinomas.

b)Carcinomas en Grano de Avena de pulmón.

c)Hipernefromas.

d)Carcinomas papilares de ovario.

e)Carcinomas medulares tiroides.

254.– En el pulmón suelen tener una localización periférica los carcinomas.

a)Epidermoides.

b)Adenocarcinomas.

c)De células en Grano de Avena.

d)Bronquiolares.

e)Adenoide quístico.

255.– La cirrosis hepática avanzada determina:

a)El favorecimiento en la aparición de hepatocarcinoma.

b)Varices esofágicas.

c)Hipertensión portal.

d)Telangiectasias.

e)Todas ellas.

256.– ¿Cuál de los siguientes tumores ováricos es más probable que produzca virilización?

a)cistadenomas celómicos.

b)Tumores germinales.

c)Tumores del estroma específico ováricos.

d)Tumores de la superficie ovárica mulleriana.

e)Todos los anteriores.

257.– El tejido fibroso como constituyente del carcinoma escirro común de la mama:

- a) Puede metastatizar.
- b) Puede producir una masa muy firme.
- c) Representa un fibrosarcoma coexistente.
- d) Es diagnóstico de la enfermedad de Paget.
- e) Es un Hamartoma.

258.- La demostración del antígeno carcinoembrionario (Ace) es útil como indicador de recidiva tumoral en cánceres:

- a) Mesodérmicos.
- b) Extodérmicos.
- c) Endodérmicos.
- d) En cualquiera de las tres hojas.
- e) Ninguna de las anteriores.

259.- El granuloma epitelioides aparece en estos procesos excepto en uno:

- a) Tuberculosis.
- b) Lepra tuberculoide.
- c) Enfermedad de Crohn.
- d) Sarcoidosis.
- e) Toxoplasmosis.

260.- ¿Cuál de las siguientes posibilidades evolutivas del trombo es la más desfavorable?

- a) Recanalización.
- b) Reabsorción.
- c) Calcificación.
- d) Desprendimiento.
- e) Organización.

261.- Un tipo peculiar de degeneración hialina a nivel de los hepatocitos (sustancia hialina de Mallory) se observa en:

- a) La hepatitis alcohólica.

b)Hepatocarcinomas.

c)Colestasis intrahepáticas.

d)Hepatocolangiomas.

e)Colestasis extrahepática.

262.- El tumor glómico:

a)Con frecuencia es pequeño y doloroso.

b)Con frecuencia es grande y doloroso.

c)Suele alcanzar grandes dimensiones.

d)Se maligniza fácilmente.

e)Es un tumor epitelial benigno.

263.- Hay algunos osteosarcomas que se asientan sobre huesos lesionados previamente por:

a)Fracturas con enclavamiento de los fragmentos.

b)Hematomas superiústicos.

c)Osteoma osteoide.

d)Condrosarcoma.

e)Enfermedad de Paget y radiaciones.

264.- El síndrome de Budd-Chiari puede producirse entre otras cosas por:

a)Trombos de vena suprahepática.

b)Tumor abdominal.

c)Tumor mucinoso de ovario.

d)Tumores funcionantes.

e)Trombosis mesentéricas.

265.- ¿Cuál de estos tumores testiculares suele observarse a una mayor edad?

a)Carcinoma embrionario.

b)Teratoma.

c)Seminoma.

d)Seminoma espermatocítico.

e)Coriocarcinoma.

266.– Un testículo criptorquíptico en un adulto:

a)Debe administrarse terapéutica hormonal para que descienda.

b)Debe ser descendido mediante procedimiento quirúrgico.

c)Se debe extirpar porque son más susceptibles de desarrollar tumores.

d)Si no molesta por pequeño, es inútil toda actividad y no debe hacerse nada.

e)Ver si hay espermatogénesis por biopsia y proceder al descenso.

267.– La fracción C3 del complemento suele estar persistentemente baja en:

a)Glomerulonefritis extramembranosa.

b)Glomerulonefritis proliferativa segmentaria y focal.

c)Pielonefritis.

d)Glomerulonefritis membrano proliferativa.

e)Glomerulonefritis proliferativa endocapilar.

268.– Una enfermedad por anticuerpos anti-membrana basal glomerular se observa en:

a)Púrpura de Schenlein–Hensen.

b)Granulomatosis de Wegener.

c)Glomerulonefritis membranosa proliferativa.

d)Síndrome de Goodpasture.

e)Lupus eritematoso.

269.– La lesión objetivable en el síndrome nefrótico con lesiones glomerulares mínimas es:

a)Proliferación endocapilar.

b)Engrosamiento de la membrana basal.

c)Depósitos capilares.

d)Fusión pedicelar.

e)Formación de semilunas epiteliales.

270– La glomerulonefritis proliferativa segmentaria y focal suele manifestarse clínicamente por:

- a) Síndrome nefrítico.
- b) Hematuria recurrente.
- c) Hipertensión.
- d) Liguria.
- e) Hipertensión y proteinuria.

271.– ¿Cuál de los siguientes tumores tienen estroma aniloide?

- a) Carcinoma bronquial.
- b) Carcinoma bronquiolar.
- c) Carcinoma medular de tiroides.
- d) Carcinoma medular de mama.
- e) Carcinoma gástrico.

272.– El higroma quístico es un tumor:

- a) Muscular.
- b) Vascular.
- c) Epitelial.
- d) Nervioso.
- e) Glandular.

273.– El seminoma es un tumor propio de:

- a) Corazón.
- b) Hipófisis.
- c) Tiroides.
- d) Testículo.
- e) Timo.

274.– La arteria que con más frecuencia se ocluye en la cardiopatía coronaria es:

- a) Descendente anterior izquierda.

b)Marginal izquierda.

c)Coronaria derecha.

d)Arteria del seno.

e)Marginal derecha.

275.- La esclerosis de Menkebery es una:

a)Calcificación de la capa media de las arterias.

b)Calcificación de la válvula tricúspide.

c)Atrofia de las Válvulas venosas.

d)Defectuosa permeabilidad de los capilares.

e)Dilatación de las venas uterinas.

276.- ¿Cuál de los siguientes elementos es especialmente abundante en sangre periférica durante el curso de una leucemia mieloidea aguda?

a)Eosinófilo.

b)Linfocito.

c)Basófilo.

d)Linfoblasto.

e)Mieloblasto.

277.- Uno de estos tumores no es de origen linfático, ¿cuál?

a)Linfoma linfocítico.

b)Linforma de Burkitt.

c)Linfoma linfoblástico.

d)Linfoepitelioma.

e)Micosis fungoide.

278.- ¿Cuál de las siguiente formas de necrosis es característica de lesiones pancreáticas?.

a)De coagulación.

b)Colicuvativa.

c)Gaseosa.

d)Gangrenosa.

e)Ninguna de éstas.

279.- Los tofos se producen en los trastornos de:

a)Maduración celular.

b)Metabolismo de los hidratos de carbono.

c)Metabolismo de las nucleoproteínas.

d)Metabolismo de los lípidos.

e)Hipercale?

280.- No es una neumoconiosis:

a)Silicosis.

b)Asbestosis.

c)Nocardosis.

d)Beriliosis.

e)Antracosis.

281.- En la diabetes existe una frecuente alteración a nivel:

a)Renal.

b)Capilar.

c)Ocular.

d)Todos ellos.

e)Ninguno.

282.- El coágulo postmortem se caracteriza por ser:

a)Poroso, friable y adherido a la pared del vaso.

b)Elástico, brillante y adherido.

c)Rugosos y friable.

d)Elástico, rugoso, adherido.

e)Liso, friable y elástico.

283.– Las lesiones de los glomérulos renales que se observan en casos de diabetes se deben al aumento de las células:

- a)Endoteliales capilares.
- b)Epiteliales capilares.
- c)Epiteliales capsulares.
- d)Mesangiales y de la matriz.
- e)Del aparato yuxtaglomerular.

284.– ¿Cuál de las siguientes enfermedades no es de naturaleza autoinmune?

- a)Lupus eritematoso diseminado.
- b)Tiroiditis de Hashimoto.
- c)Artritis reumatoide.
- d)Asma.
- e)Glomerulonefritis (Nefrotóxica)

285.– El carácter maligno de una neoplasia viene determinado por:

- a)Ausencia de cápsula.
- b)Atipia celular.
- c)Metástasis de distancia.
- d)Buena diferenciación celular.
- e)Todas ellas.