

EXAMEN JUNIO 2003

- El IMC es el producto en Kg dividido por la altura al cuadrado V
- Un IMC entre 17 y 19 se asocia normalmente a amenorrea V
- En la fobia específica los mayores datos los han aportado los modelos

cognitivos F

- La disforia o depresión mayor es un trastorno asociado a la anorexia nerviosa V
- En la anorexia hay un déficit en la identificación y expresión del afecto V
- En la AN y la BN normalmente se da ansiedad tras los atracones V
- TIV, AN y BN se asocian a los estados de ánimo V
- En la bulimia (atracones) subjetivos se ingieren grandes cantidades de comida en la pérdida de control F
- Strelau y modelo biológico
- Una de las aportaciones en que se basan los modelos biológicos del ataque de pánico es la especificidad de algunas drogas V
- Lo que diferencia la fobia social del resto de las fobias es que el miedo asociado a la misma provocaba el deterioro en la ejecución de la tarea V
- Apatía, falta de interés, enlentecimiento motor en la depresión se explica por un patrón de inhibición conductual F
- La triada cognitiva de Beck incluye pensamiento automático, sesgos, y distorsiones de la realidad F
- Mowrer afirma que la conducta de evitación de la vida real contribuye a la extinción de las fobias F
- En la depresión mayor los fracasos se atribuyen a causas internas, inestables y específicas; y los éxitos a causas externas, estables y globales F
- Las investigaciones han demostrado que todos los agorafóbicos han padecido fobia escolar F
- Los datos aportan que la transmisión genética genera potencialidades para adquirir trastornos de ansiedad general, no específicos V
- Estudio de Minnessota y efectos del ayuno V
- Algunos autores sugieren que el TOC lleva implícito déficit de memoria y en procesamiento de la información V
- En los TOC algunos autores relacionan su sintomatología con cambios hormonales V