

De los siguientes enunciados, escoge el que no corresponde a los síntomas del prolapso genital:

- a) Sensación de peso perineal b) Incontinencia de Orina c) Presencia del cuello en introito genital
- d) Constipación

El uretrocistocele es una entidad que se considera un prolapso genital:

- a) Alto b) Proximal c) Bajo d) a y c e) sólo c

En la primera mitad del embarazo el líquido amniótico es con relación al plasma de la madre:

- a) Isotónico b) Hipotónico c) Hipertónico

La principal fuente del líquido amniótico durante el embarazo es de::

- a) Origen renal b) Árbol tráqueobronquial c) Piel

El más importante mecanismo de reabsorción del líquido amniótico es::

- a) Membranas Corioamnióticas b) Piel fetal c) Funiculo d) Deglución fetal

La proteína más abundante en el líquido amniótico es:

- a) Albumina b) IgG c) IgM d) Transferrina

Los desgarramientos perineales completos se consideran de::

- a) Primer grado b) Segundo grado c) Tercer grado

El descenso completo de todos los elementos que pueden protuir por el canal genital se le conoce como:

- a) Histerocele b) Douglascele c) Electrocele d) Colpocistocele

En el primer trimestre de la vida intrauterina el líquido amniótico no es producido por:

- a) Piel b) Cordón Umbilical c) Membrana corioamniótica

Cuando en el feto se presenta un caso de atresía esofágica; o hiperglicemia se desarrolla:

- a) Oligoamnios b) Polihídramnios c) El líquido no se afecta

Dentro de las causas maternas del polihidramnios , no se encuentran:

- a) Diabetes mellitus b) Isoinmunización Rh c) Ingestión del litio d) Embarazo múltiple

Entre las causas fetales del oligomnios no se encuentra:

- a) Sufrimiento fetal crónico b) Retraso del crecimiento intrauterino c) Hipertensión arterial

d) Embarazo prolongado

El principal mecanismo de la hernia genital es:

a) Falla de la competencia perineal b) Disfunciones de los mecanismo esfinterianos y/o del resorvorio que producen incontinencia urinario y/o fecal c) Ambas ciertas d) Sólo b es correcta

Del total de mujeres que presentan hernia genital, la cantidad que asisten a la consulta y requieren de tratamiento es de:

a) 40% -50% b) 10% - 20% c) 2% - 5%

El aparato ligamentoso cumple para el útero la función de:

a) Sostén b) Fijación c) Sustentación